

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Nivolumab+FP(食道癌)	28日間	高度催吐性リスク(day1) 最小度催吐性リスク(day15)

輸液セット
インラインフィルター

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
アプレピタント125mg	1Tab	1×化学療法60~90分前	●																												
アプレピタント80mg	1Tab	1×朝	/	●	●																										
デキサメタゾン	8mg	1×朝	/	●	●	●																									
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	21	21	21	21	21
1	生理食塩液	500mL	メイン	2時間	●																										
2	生理食塩液	50mL	側管	15分 RP1と同時に開始	●														●												
3	ニボルマブ* 生理食塩液	240mg/body 100mL	側管	30分	●														●												
4	生理食塩液	50mL	側管	15分	●														●												
5	パロノセトロン デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	側管	30分	●																										
6	硫酸マグネシウム 生理食塩液	8mEq 50mL	側管	30分	●																										
7	フルオロウラシル 生理食塩液	800mg/m ² 1300mL	メイン	24時間	●	●	●	●	●																						
8	シスプラチン 生理食塩液	80mg/m ² 350mL	側管	2時間	●																										
9	20%マンニトール	300mg	側管	30分	●																										
10	ソリタT3	500mL	側管	2時間	●																										
11	ソリタT3	500mL	側管	2時間	●																										

*インラインフィルターを使用すること