| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|---|---|---|
| TC（卵管癌） | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| | 薬剤 | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ジフェンヒドラミン | 50mg（5錠） | パクリタキセル投与開始<br>30分前までに内服 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソリューゲンF | 500mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセトロン3mg<br>ファモチジン<br>デキサメタゾン | 1バッグ<br>20mg<br>16.5mg | メイン | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル<br>生理食塩液 | 175mg/㎡<br>500mL | メイン<br>フィルター付専用ルートを使用すること | 3時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | カルボプラチン<br>生理食塩液 | AUC 5<br>500mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ソリタT3 | 200mL | メイン | 1時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |