Intensification BH+weekly L-asp

| 薬剤                       | 用量  | 投与方法                                    | -1 | 1 | 2  | 3    | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------|---|---|----|---|----|------|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| アセタゾラミド                  | 5歳未満 125 mg<br>5歳以上 250 mg                      | PO or IV<br>MTX投与<br>12時間前から<br>12時間毎7回 | 0  | _ | 00 | 00   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| YDソリタT3.<br>7%メイロン       | 500 mL  | 100mL/m³/hr.                            |    |   |    |      |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| MTX<br>生理食塩液             | 3000 mg/m <sup>2</sup> no limit<br>total 480 mL | DIV 24hr                                |    |   |    |      |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| CF                       | .15 mg/m²                                       | IV<br>MTX投与後<br>36時間めから<br>6時間毎7回       |    |   | 0  | 0000 | 00 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| L-asp<br>注射用水<br>YDソリタT3 | 6000 U/m no limit<br>6 mL/m<br>200 mL           | DIV 3hr                                 |    |   |    |      |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

