

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
オプジーブ [®] +SOX	21日間	中等度催吐性リスク

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
S-1	S-1投与量に準ずる (論文上80mg/m ² /day)	2×朝・夕食後	●	→													●	内服14日間で終了							
アプレピタント125mg(イメド)	1cp	1×化学療法60~90分前	●																						
アプレピタント80mg(イメド)	1cp	1×朝		●	●																				
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg 100mL	メイン	30分	●																				
3	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
4	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	15分	●																				
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●																				
6	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				

ニボルマブはインラインフィルターを使用