

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
オプジーボ+mFOLFOX(胃癌)	14日間	中等度催吐性リスク(イメンド併用)

		薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		アプレピタント (イメンド)	125mg	1×朝	●														
		アプレピタント (イメンド)	80mg	1×朝		●	●												
滴下順		薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		生理食塩液	50ml	メイン	15分	●													
2		ニボルマブ 生理食塩液	240mg 100ml	メイン	30分	●													
3		生理食塩液	50ml	メイン	15分	●													
4		グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	15分	●													
5		レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●													
		オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL	側管	2時間	●													
6		フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	メイン	全開	●													
7		フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 適宜調節	メイン	46時間	●	→												

ニボルマブはインラインフィルターを使用