

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|------------|------|-----------|
| CapeOX+HER | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| 薬剤 | | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| カペシタビン(ゼロダ) | | 2000mg/m ² | 2×朝・夕食後 | ● | → | | | | | | | | | | | | | ● | 内服14日間で終了 | | | | | | |
| アプレピタント125mg(イメド) | | 1cp | 1×化学療法60～90分前 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプレピタント80mg(イメド) | | 1cp | 1×朝 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | グラニセトロン3mg デキサメタゾン | 1バッグ 3.3mg | メイン | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | トラスツズマブ 生理食塩液 | 8mg/kg(初回) 6mg/kg(維持) 250mL | メイン | 90分※ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | オキサリプラチン 5%ブドウ糖 | 130mg/m ² 250mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 100mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。