レジメン名称	1コース	催吐性リスク
XP	21日間	高度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	カペシタビン（ｾﾛｰﾀﾞ）	カペシタビンの投与量に準ずる	2×朝・夕食後		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	14日間内服					
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前		●																			
	イメンド80mg	1cp	1×朝			●	●																	
	デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●	●	○※	※○は嘔気によって5日目まで内服も可														

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ラクテック	500mL	メイン	6時間	●																				
2	ラクテック	500mL	メイン	6時間	●																				
3	ソリタT3	500mL	メイン	6時間	●																				
4	ソリタT3	500mL	メイン	6時間	●																				

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	メイン	15分		●																			
2	シスプラチン 生理食塩液	80mg/㎡ 400mL	メイン	2時間		●																			
3	マンニゲン	200mL	メイン	30分		●																			
4	ソリタT3	500mL	メイン	2時間		●																			
5	ソリタT3	500mL	メイン	2時間		●																			
6	ソリタT3	500mL	メイン	2時間		●																			