

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
BEP	21日間	高度催吐性リスク、最小度催吐性リスク(day8,15)

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イメンド125mg	1cp	1×化学療法60~90分前	●																				
イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●	○	○	※○は嘔気によって内服可															
デキサメタゾン	8mg(16錠)	2×朝・昼						○	○														

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ソリューゲンG	500mL	メイン	3時間	●	●	●	●	●																
2	プレオマイシン 生理食塩液	30mg 50mL	側管	15分 (全開)	●																				
3	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	側管	30分	●	●	●	●	●																
4	エトポシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	側管	2時間	●	●	●	●	●																
5	生理食塩液 アスパラカリウム	1300mL 2A	メイン	5時間	●	●	●	●	●																
6	マンニトール	300mL	側管	30分	●	●	●	●	●																
7	シスプラチン 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	側管	2時間	●	●	●	●	●																
8	ソリューゲンG	500mL	メイン	2時間	●	●	●	●	●																
1	生理食塩液	50mL	メイン	30分								●							●						
2	プレオマイシン 生理食塩液	30mg 50mL	メイン	全開								●							●						
3	生理食塩液	50mL	メイン	30分								●							●						