

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|------------|------|----------|
| FP-RT(食道癌) | 28日間 | 高度催吐性リスク |

DDP:50mg/m²未満であるが国内ガイドラインに準じて高度催吐性としている

| 薬剤 | | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|-----------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| イメンド125mg | | 1cp | 1×化学療法60~90分前 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イメンド80mg | | 1cp | 1×朝 | / | ● | ● | | | | | / | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン | | 8mg | 1×朝 | / | ● | ● | ● | ○* | | | / | ● | ● | ● | ○* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ※○は嘔気によって5日目まで内服も可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | ソリューゲンF | 500mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | パロノセトロン デキサメタゾン | 1バッグ 6.6mg | 側管 | 15分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 400mg/m ² 1300mL | メイン | 24時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | フロセミド | 20mg | 側管 | 静注 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | シスプラチン 生理食塩液 | 40mg/m ² 500mL | 側管 | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ソリタT3 | 500mL | 側管 | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ソリタT3 | 500mL | 側管 | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線療法 | | 2Gy×15(2コースで×30となり60Gy) | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |

注:レジメンはスケジュール管理の都合上、1コース28日で設定しているが、実際は2コース56日で1セットとして治療を行う。