

佐世保共済病院

採 用 医 薬 品 一 覧

(第 46 版)

2 0 2 4

利用の手引き

1. 本書は2024年10月1日現在の当院採用医薬品を収載したものです。
2. 本書は「薬品名五十音順一覧 内用薬・注射薬・外用薬」から構成しています。
3. 本書に収載している薬剤につきましては最小限の情報を記載しています。詳細については電子カルテシステム上の「薬品情報検索」、「DI 検索 Web」または、院内ポータル Top ページにある「医薬品情報」を参照してください。

薬品名の前に記載している略号の解説

(麻)・・・麻薬	(毒)・・・毒薬
(約束)・・・院内約束処方	(限)・・・患者限定薬
(院外)・・・院外処方のみ	

目次

薬品名五十音順一覧	内用薬・・・	3
	注射薬・・・	17
	外用薬・・・	25
	約束処方一覧・・・	31
	限定薬一覧・・・	33

作成日：2024年10月1日

五十音順

内 用 薬

— あ —

- アイセントレス錠(400mg)
アイトロール錠(20mg)
(院外)アイピーディカプセル(100mg)
アイピーデイドライシロップ5%
アイミクス配合錠HD
アクトス錠(15mg)
アコファイド錠(100mg)
(院外)アコニンサン錠
アサコール錠(400mg)
アザニン錠(50mg)
アザルフィジンEN錠(500mg)
アシクロビルDS80%「NK」
(院外)アシテアダニ舌下錠(100IR)(300IR)
(院外)アシノン錠(75mg)
(院外)アジルバ錠(20mg)(40mg)
アジルサルタン錠「武田テバ」(20mg)(40mg)
アストミン錠(10mg)
アスパラカリウム錠(300mg)
アスピリン「ヨシダ」
アスペノンカプセル(10mg)
アスベリンシロップ0.5%
アスベリン散10%
アセチルシステイン内用液「あゆみ」(20ml/本)
アセトアミノフェン錠「マルイシ」(200mg)(500mg)
(院外)アセトアミノフェン錠「マルイシ」(300mg)
アセトアミノフェン細粒20%「マルイシ」
(院外)アゼルニジピン錠「NP」(8mg)
アゾセミド錠「DSEP」(30mg)
アダプチノール錠(5mg)
(院外)アダラートCR錠(20mg)
アタラックス錠(25mg)
アーチスト錠(2.5mg)(10mg)
アデホスコワ顆粒10%
アテレック錠(10mg)
(限)アドシルカ錠(20mg)
(院外)アトーゼット配合錠LD
(院外)アトーゼット配合錠HD
アドソルビン原末※院内のみ処方可(在庫限り)
メーカー出荷停止のため
アドナ散10%
アドナ錠(30mg)
アトルバスタチン錠「日医工」(5mg)(10mg)
アフィニトール錠(5mg)
(麻)アブストラル舌下錠(100 μ g)
(限)(麻)アブストラル舌下錠(200 μ g)
(院外)アプレゾリン錠(10mg)
アブレピタントカプセル「NK」(80mg)(125mg)
(院外)アボルブカプセル(0.5mg)
(院外)アマージ錠(2.5mg)
(院外)アマリール錠(1mg)
(毒)アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」(100mg)
アミティーザカプセル(12 μ g)(24 μ g)
アミノレバンEN配合散(50g/包)
(フルーツ味、コーヒー味)
アムロジピンOD錠「トーワ」(2.5mg)(5mg)
(院外)アムロジンOD錠(2.5mg)(5mg)
アメジニウムメチル硫酸塩錠「フー」(10mg)
アメンアリーフ錠(200mg)
アモキシシリンカプセル「日医工」(250mg)
(院外)アリセプトD錠(3mg)(5mg)
アーリーダ錠(60mg)
アリナミンF糖衣錠(25mg)
アリミデックス錠(1mg)
(院外)アルジオキサ錠(100mg)「あすか」
アルダクトンA錠(25mg)※スピロラクトン供給不安定の
為、一時的に院内採用。安定次第「院外のみ」に変更予定
アルダクトンA細粒10%
(院外)アルドメット錠(250mg)
アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」
アルファロールカプセル(1 μ g)
アルファロール内用液(0.5 μ g/mL)(10ml/瓶)
アルプラゾラム錠「サワイ」(0.4mg)
アルロイドG内用液5%(600ml/瓶)
(院外)アレグラ錠(30mg)(60mg)
アレジオン錠(20mg)
アレピアチン錠(100mg)
(院外)アレロックOD錠(5mg)
(院外)アレロック顆粒0.5%(0.5g/包)

アレンドロン酸錠35mg「日医工」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノール塩酸塩錠(10mg)「DSP」
アロプリノール錠「サワイ」(100mg)
アロマシン錠(25mg)
アンコチル錠(500mg)
(院外)アンプラーグ錠(50mg)(100mg)
アンブロキソール塩酸塩錠「ト-ワ」(15mg)
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠「サワイ」(45mg)

— い —

イグザレルド錠(10mg)(15mg)
(限)イクスタンジ錠(40mg)
イクスタンジ錠(80mg)
(院外)イーケプラ錠(500mg)
(院外)イーケプラドライシロップ50%
イコサペント酸エチル粒状カプセル「TC」(900mg)
イスコチン錠(100mg)
イソソルビド内服ゼリー70%分包「日医工」(30g)
(院外)イソバイドシロップ70%分包(30mL)
イトリゾール内用液1%
(院外)イニシク配合錠
イノラス配合経腸用液 125mL/袋(200kcal)
紅茶、コーヒー
(院外)イノラス配合経腸用液 187.5mL/袋(300kcal)
りんご、コーヒー、いちご、ヨーグルト
イフェンプロジル酒石酸塩錠「ト-ワ」(20mg)
イブランス錠(25mg)(125mg)
(院外)イメンドカプセル(80mg)(125mg)
(院外)イリボーOD錠(2.5 μ g)
イリボーOD錠(5 μ g)
イルベタン錠(100mg)
イレッサ錠(250)
インクレミンシロップ5%
インデラル錠(10mg)
(限)インライタ錠(1mg)(5mg)

— う —

(限)ヴォトリエント錠(200mg)
ウテメリン錠(5mg)
(毒)ウブレチド錠(5mg)

ウラリット配合錠
ウラリット-U配合散(1g/包)
ウリトスOD錠(0.1mg)
ウルソ顆粒5%
(院外)ウルソ錠(100mg)
ウルソデオキシコール酸錠「ト-ワ」(100mg)
ウロカルン錠(225mg)
※2024.3.23～処方マスタ止(原料不足による出荷停止)

— え —

エカード配合錠HD
エクア錠(50mg)
エクセグラン錠(100mg)
(院外)エクセグラン散20%
エクメット配合錠(LD)(HD)
SG顆粒(1g/包)
(院外)エストラサイトカプセル(156.7mg)
(院外)エストリール錠(1mg)
エスワンタイホウ配合 OD 錠(T20)(T25)
エゼチミブ錠「YD」(10mg)
エソメプラゾールカプセル「ニフロ」(10mg)(20mg)
エチゾラム錠「ト-ワ」(0.5mg)
エックスフォージ配合OD錠
(院外)エディロールカプセル(0.75 μ g)
エドルミズ錠(50mg)
エナラプリルマレイン酸塩錠(2.5mg)(5mg)「ケミファ」
エネーボ配合経腸用液
(院外)エバステル OD 錠(10mg)
(院外)エパデールS(900mg/包)
エビスタ錠(60mg)
エビプロスタット配合錠DB
エビリファイ錠(1mg)(12mg)
エフィエント錠(3.75mg)
エフィエント OD 錠(20mg)
(院外)エプクルーサ配合錠
エプトール錠(250mg)
エフピーOD錠(2.5mg)
エブランチルカプセル(15mg)
エペリゾン塩酸塩錠「ト-ワ」(50mg)
(院外)エベレンゾ錠(20mg)
エベレンゾ錠(50mg)

(麻)MS-コンチン錠(10mg)(30mg)(60mg)
エリキユース錠(2.5mg)(5mg)
(院外)エリスロマイシン錠「サワイ」(200mg)
エリスロシンドライシロップW20%
(院外)エルカルチン FF 錠(100mg)
エルデカルシトールカプセル「日医工」(0.75μg)
エレンタール配合内用剤(80g/包)
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤
塩化カリウム「フー」
塩化カリウム除放錠600mg「St」
塩化ナトリウム
(院外)エンシュア・リキッド(ストロベリー)
エンタカポン錠「サンド」(100mg)→削除;在庫限り
エンドキサン錠(50mg)
エンペラシン配合錠
エンレスト錠(100mg)
(院外)エンレスト錠(200mg)

— お —

(麻)オキシコンチン TR 錠(5mg)(20mg)(40mg)
(麻)オキノーム散(5mg)
(麻)オキノーム散(2.5mg)
(限)(麻)オキノーム散(20mg)
(院外)(限)(麻)オキノーム散(10mg)
オーグメンチン配合錠250RS
オゼックス細粒小児用15%(150mg/g)
オダイン錠(125mg)
オノンカプセル(112.5mg)
※院内のみ処方可 2021.9.8 掲示板参照
オノンドライシロップ10%
(院外)オフエブカプセル(100mg)(150mg)
(限)オプスミット錠(10mg)
(麻)オプソ内服液(5mg)(10mg)
(院外)オメプラール錠(10mg)
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル「MJT」(2g/包)
(院外)オラビ錠口腔用(50mg)
オラペナム小児用細粒10%
オランザピン OD 錠「DSEP」(5mg)
オルメサルタン OD 錠「DSEP」(20mg)
(院外)オルメテック OD 錠(20mg)(40mg)
オルケディア錠(1mg)(2mg)

(院外)オルケディア錠(4mg)
オロパタジン塩酸塩 OD 錠「サワイ」(5mg)
オングリザ錠(2.5mg)

— か —

(院外)加エブシ末(0.5g/包)
ガスコン錠(40mg)
(院外)ガスコンドロップ内用液 2%
(院外)ガスター-D錠(10mg)(20mg)
(院外)ガスター錠(20mg)
ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)
ガストログラフィン経口・注腸用(100ml/本)
(院外)ガスモチン錠(5mg)
ガスロンN錠(4mg)
(院外)カソデックス OD 錠(80mg)
(院外)カデュエット配合錠4番
(院外)カナグル OD 錠(100mg)
カナマイシンカプセル(250mg)
(院外)カナリア配合錠
カバサール錠(0.25mg)
ガバペン錠(200mg)
(院外)ガバペン錠(300mg)
カプトリル細粒5%←処置入力のみ可
カブレラサ錠(100mg)
カペシタビン錠「ヤルト」(300mg)
カボメテイクス錠(20mg)(60mg)
カモスタットメシル酸塩錠「トー」(100mg)
カリメート散(5g/包)
カリメート経口液20%(25g/包)
カルグート錠10
(院外)カルタン錠(500mg)
(院外)カルデナリン錠(1mg)
カルナクリン錠(25単位)
カルブロック錠(16mg)
カルボシステイン錠「トー」(500mg)
カルボシステインシロップ5%「効効」
カルボシステイン DS 50%「効効」
カロナール細粒20%
カロナール錠(200mg)(500mg)
(院外)カロナール錠(300mg)
カンデサルタン OD 錠「サワイ」(4mg)(8mg)

— き —

キシロカインビスカス 2%
キックリンカプセル(250mg)
キネダック錠(50mg)
キプレス細粒(4mg)
キプレス OD 錠10mg
キプレスチュアブル錠(5mg)
(院外)キャピリン配合錠
球形吸着炭細粒「マイラン」(2g/包)

— く —

クエチアピン錠「アム」(25mg)
クエン酸第一鉄 Na 錠「サワイ」(50mg)
グーフィス錠(5mg)
グラクティブ錠(50mg)
グラケーカプセル(15mg)
(院外)クラシエEK-24加味逍遥散料エキス細粒(2g/包)
(院外)クラシエEK-41補中益気湯エキス細粒(2.5g/包)
(院外)クラシエEK-49加味帰脾湯エキス細粒(2.5g/包)
グラニセトロン内服ゼリー「ケミファ」(2mg)
クラバモックス小児用(0.505g/包)ドライシロップ
(院外)クラビット錠(250mg)
グラマリール錠(50mg)
(院外)クラリシッド錠(200mg)
(院外)クラリシッド錠小児用(50mg)
クラリスロマイシン錠「サワイ」(200mg)
クラリスロマイシン錠小児用「サワイ」(50mg)
クラリスロマイシン DS 小児用10%「トワ」
(院外)クラリチンドライシロップ1%
(院外)クラリチンレディタブ錠(10mg)
(院外)グランダキシン錠(50mg)
クリアナール錠(200mg)
グリチロン配合錠
グリベック錠(100mg)
グリメピリド OD 錠「トワ」(1mg)
グルベス配合 OD 錠
(院外)グルファスト OD 錠(10mg)
(院外)グレースビット錠(50mg)

(院外)クレストール OD 錠(2.5mg)
(院外)クレメジン細粒(2g/包)
(院外)クレメジンカプセル(200mg)
(限)クレメジン速崩錠500mg)
クロピドグレル錠「SANIK」(25mg)(75mg)
(院外)クロミッド錠(50mg)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠(2mg)「NIG」

— け —

(限)ケアラム錠(25mg)
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)
ケイツーシロップ0.2%(1ml/包)
ケタスカプセル(10mg)
ケフラルカプセル(250mg)
ケフラル細粒小児用100mg
ケレンディア錠(10mg)
(院外)ケレンディア錠(20mg)

— こ —

(院外)コタローN320腸癰湯エキス細粒(2g/包)
コートリル錠(10mg)
(院外)コートン錠(25mg)
コスパノン錠(80mg)
(院外)コディオ配合錠 EX
コデインリン酸塩散1%(ハチ)
(院外)コニール錠(4mg)
(院外)コムタン錠(100mg)
コメリアンコーワ錠(100mg)
コルヒチン錠(0.5mg)
(院外)コンスタン錠(0.4mg)
コントミン糖衣錠(25mg)
コンバントリン錠(100mg)
コロنفオート内用懸濁液25%

— さ —

サアミオン錠(5mg)
(院外)ザイザル錠(5mg)
ザイザルシロップ0.05%
サイトテック錠(100 μ g)
ザイティガ錠
(院外)ザイロリック錠(100mg)

(院外) サインバルタカプセル(20mg)

ザクラス配合錠 HD

ザジテンドライシロップ 0.1%

(院外) ザジテンカプセル(1mg)

(院外) ザファテック錠(50mg)(100mg)

サムスカ OD 錠(7.5mg)(15mg)

(限)サムスカ OD 錠(30mg)

サムチレール内用懸濁液15%(5ml/包)

(限) サラジェン錠(5mg)

サラゾピリン錠(500mg)

サリグレンカプセル(30mg)

ザルティア錠(5mg)

(院外) ザルトプロフェン錠「日医工」(80mg)

サルポグレラート塩酸塩錠「オーハラ」(100mg)

(院外) サワシリンカプセル(250mg)

酸化亜鉛錠「ノヘル」(25mg)

酸化マグネシウム細粒 83%「ケンエー」(0.6g/包)

サンリズムカプセル(25mg)

サンリズムカプセル(50mg)

(院外) 三和EK-180桂芍知母湯(3g/包)

— し —

(約束) CMCP(1g/包)

ジェイゾロフト錠(50mg)

ジェニナック錠(200mg)

ジエノゲスト錠「モチダ」(0.5mg)(1mg)

(院外) ジェミーナ配合錠

(院外) シグマート錠(5mg)

(院外) ジゴシン散0.1%

ジスロマック細粒小児用10%

ジスロマック錠(250mg)

シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU

(院外) シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU

シナール配合顆粒(1g/包)

(院外) シナール配合錠

(院外) ジブレキサザイデイス錠(5mg)

シベクトロ錠(200mg)

シベノール錠(50mg)

ジメチコン内用液2%「ホリイ」

ジャディアンス錠(10mg)

シュアポスト錠(0.5mg)

硝酸イソソルビド徐放錠「サワイ」(20mg)

シロスタゾールOD錠「サワイ」(50mg)(100mg)

シロドシンOD錠4mg「オーハラ」

(院外) シングレア細粒(4mg)

(院外) シングレア錠(10mg)

(院外) シングレアチュアブル錠(5mg)

シンメトレル錠(100mg)

— す —

(院外) スイニー錠(100mg)

スインプロイク錠(0.2mg)

スーグラ錠(50mg)

(院外) スージャヌ配合錠

(限) スタレボ配合錠 (L50)(L100)

スチパーガ錠(40mg)

(限) スーテントカプセル(12.5mg)

ストミンA配合錠

ストロカイン錠(5mg)

ストロメクトール錠(3mg)

スパカール錠(40mg)

(院外) スピロノラクトン錠「CH」(25mg) ←供給安定するまでマスタ停止中。院外のみ処方可

スピロペント錠(10 μ g)

スプリセル錠(20mg)

— せ —

精製水(水剤希釈用)

セイブルOD錠(50mg)

(院外) セキソビット錠(100mg)

ゼジューラ錠(100mg)

(院外) ゼチーア錠(10mg)

(院外) セチロ配合錠

(院外) セパミットR細粒2%

セファドール錠(25mg)

セファランチン末1%

セファレキシシン錠 250「日医工」(250mg)

セララ錠(50mg)

セルシン錠(2mg)

(院外) セルシン錠(5mg)

セルニルトン錠

(院外)セルベックス細粒10%(0.5g/包)
(院外)セルベックスカプセル(50mg)
セレコキシブ錠「武田テバ」(100mg)
(院外)セレコックス錠(100mg)
(院外)セレスタミン配合錠
セレネース錠(0.75mg)
(院外)ゼローダ錠(300mg)
(院外)セロクエル錠(25mg)
(院外)セロクラール錠(20mg)
(院外)セロケン錠(20mg)
センノシド錠「サワイ」(12mg)

— そ —

(院外)ソタコール錠(40mg)
ソタロール塩酸塩錠「TE」(40mg)
ゾフルーザ錠(20mg)
(院外)ゾーミグRM錠(2.5mg)
(院外)ソラナックス錠(0.4mg)
ソランタール錠(100mg)
ゾルピデム酒石酸塩OD錠「サワイ」(5mg)
(院外)ソレトン錠(80mg)

— た —

(院外)ダイアート錠(30mg)
ダイアモックス錠(250mg)
タイケルブ錠(250mg)
(院外)太虎堂EK-230キウウ婦調血飲(2g/包)
ダイフェン配合顆粒「鶴原」
ダイフェン配合錠「鶴原」
タケキャブ錠(10mg)(20mg)
(院外)タケプロンOD錠(15mg)
タケルダ配合錠
タナドール顆粒75%
タナトリル錠(5mg)
ダフクリア錠(200mg)
タブネオスカプセル(10mg)
ダーブロック錠(2mg)
(院外)ダーブロック錠(4mg)
タミフルドライシロップ3%
タミフルカプセル(75mg)
タムスロシン塩酸塩OD錠「VTRS」(0.2mg)

ダラシнкаプセル(150mg)
タリオンOD錠(10mg)
タリージェOD錠(5mg)(10mg)
(院外)タリージェOD錠(2.5mg)(15mg)
(限)タルチレリン錠「サワイ」(5mg)
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
炭酸ランタンOD錠(250mg)
炭酸リチウム錠200「フジナガ」
単シロップ
ダントリウムカプセル(25mg)
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末

— ち —

チアトнкаプセル(10mg)
(院外)チオラ錠(100mg)
(院外)チガソнкаプセル(10mg)(25mg)
チラーヂンS錠(25μg)(50μg)
チラーヂンS散0.01%
5mcgチロナミン錠
沈降炭酸カルシウム錠「三和」(500mg)

— つ —

ツイミーグ錠(500mg)
(院外)ツートラム錠(25mg)(50mg)(100mg)
(150mg)
ツムラ001 葛根湯
(院外)ツムラ003 乙字湯
(院外)ツムラ005 安中散
ツムラ007 八味地黄丸
ツムラ008 大柴胡湯
ツムラ010 柴胡桂枝湯
(院外)ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯
ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯
ツムラ014 半夏瀉心湯
(院外)ツムラ015 黄連解毒湯
ツムラ016 半夏厚朴湯
ツムラ017 五苓散
ツムラ018 桂枝加朮附湯
ツムラ019 小青竜湯(3g/包)
ツムラ020 防已黄耆湯
ツムラ023 当帰芍薬散

ツムラ024 加味逍遙散
 ツムラ025 桂枝茯苓丸
 (院外)ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯
 (院外)ツムラ027 麻黄湯
 ツムラ028 越婢加朮湯
 ツムラ029 麦門冬湯(3g/包)
 (院外)ツムラ031 呉茱萸湯
 (院外)ツムラ032 人参湯
 (院外)ツムラ034 白虎加人参湯
 (院外)ツムラ035 四逆散
 (院外)ツムラ037 半夏白朮天麻湯
 ツムラ038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
 ツムラ039 苓桂朮甘湯
 ツムラ040 猪苓湯
 ツムラ041 補中益気湯
 ツムラ043 六君子湯
 (院外)ツムラ045 桂枝湯
 ツムラ047 釣藤散
 ツムラ048 十全大補湯
 (院外)ツムラ050 荊芥連翹湯
 ツムラ051 潤腸湯
 ツムラ052 薏苡仁湯
 ツムラ053 疎経活血湯
 ツムラ054 抑肝散
 (院外)ツムラ056 五淋散
 (院外)ツムラ059 治頭瘡一方
 (院外)ツムラ060 桂枝加芍薬湯
 (院外)ツムラ061 桃核承気湯
 ツムラ062 防風通聖散
 (院外)(科限定)ツムラ063 五積散 ※麻酔科
 (院外)ツムラ065 帰脾湯
 (院外)ツムラ067 女神散
 ツムラ068 芍薬甘草湯
 (院外)ツムラ072 甘麦大棗湯
 ツムラ078 麻杏薏甘湯
 (院外)ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏
 (院外)ツムラ086 当帰飲子
 (院外)ツムラ088 二朮湯
 ツムラ089 治打撲一方
 (院外)ツムラ092 滋陰至宝湯(3g/包)
 (院外)ツムラ096 柴朴湯

(院外)ツムラ097 大防風湯
 (院外)ツムラ099 小建中湯
 ツムラ100 大建中湯
 (院外)ツムラ101 升麻葛根湯
 (院外)ツムラ102 当帰湯
 (院外)ツムラ103 酸棗仁湯
 (院外)ツムラ104 辛夷清肺湯
 (院外)ツムラ105 通導散
 (院外)ツムラ106 温経湯
 ツムラ107 牛車腎気丸
 ツムラ108 人参養栄湯
 (院外)ツムラ110 立効散
 ツムラ111 清心蓮子飲
 ツムラ114 柴苓湯(3g/包)
 (院外)ツムラ119 苓甘姜味辛夏仁湯
 (院外)ツムラ123 当帰建中湯
 ツムラ125 桂枝茯苓丸加ヨクイニン←削除品:在庫限り
 (院外)ツムラ126 麻子仁丸
 (院外)ツムラ127 麻黄附子細辛湯
 (院外)ツムラ133 大承気湯
 (院外)ツムラ134 桂枝加芍薬大黄湯
 ツムラ137 加味帰脾湯
 (院外)ツムラ138 桔梗湯

— て —

(院外)ティーエスワン配合 OD錠 T(20mg)(25mg)
 (院外)ディオバン錠(20mg)(80mg)
 (院外)ディナゲスト錠(0.5mg)(1mg)
 ディレグラ配合錠
 (限)デエビゴ錠(2.5mg)
 デエビゴ錠(5mg)
 (院外)テオドール錠(50mg)
 テオドール錠(100mg)(200mg)
 デカドロン錠(0.5mg)(4mg)
 テグレートール細粒50%
 (院外)テグレートール錠(100mg)
 テグレートール錠(200mg)
 デザレックス錠(5mg)
 デシコビ配合錠 HT
 テトラミド錠(10mg)
 テネリア OD錠(20mg)

デノタスチュアブル配合錠
テノーミン錠(25mg)
デパケンR錠(100mg)(200mg)
デパケン細粒40%
デパス錠(0.25mg)
(院外)デパス錠(0.5mg)(1mg)
テプレノンカプセル「ト-7」(50mg)
テプレノン細粒10%「ト-7」
デプロメール錠(25mg)
(院外)デベルザ錠(20mg)
デュタステリド錠(0.5mg)「DSEP」
デュファストン錠(5mg)
デュロキセチン OD 錠「明治」(20mg)
テルネリン錠(1mg)
テルネリン顆粒 0.2%

— と —

トアラセット配合錠
ドキサゾシン錠「NS」(1mg)
ドグマチール錠(50mg)
ドネペジル塩酸塩OD錠「ニフロ」(3mg)
ドネペジル塩酸塩OD錠「タハ」(5mg)
ドパストン散 98.5%
トビエース錠(4mg)
(院外)トピナ錠(50mg)
(院外)トピロリック錠(60mg)
トピロリック錠(40mg)
ドプスOD錠(100mg)
トフラニール錠(10mg)
(限)トラクリア錠(62.5mg)
トラベルミン配合錠
トラゼンタ錠(5mg)
トラゾドン塩酸塩錠「アメル」(25mg)
(院外)トラディアンス配合錠 AP 錠
(院外)トラマールOD錠(25mg)
トラマドール塩酸塩 OD 錠「KO」(25mg)
(院外)トラムセット配合錠
トランサミン錠(250mg)
トリアゾラム錠「日医工」(0.25mg)
トリキュラー錠28
トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)

トリプタノール錠(10mg)
(院外)トリプタノール錠(25mg)
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「タイヨ」(2mg)
トリメプチンマレイン酸塩錠「ト-7」(100mg)
トレーランG75(225ml/本)
トレーランG50(150ml/本)
(院外)トレリーフ OD 錠(25mg)
ドンペリドン錠「日医工」(10mg)

— な —

ナイキサン錠(100mg)
ナウゼリンドライシロップ 1%
ナウゼリンOD錠(10mg)→在庫なくなり次第「院外のみ」
に変更予定
ナトリックス錠(1mg)
ナフトピジル OD 錠「サワイ」(50mg)
(院外)ナフトピジル OD 錠「サワイ」(75mg)
ナラトリプタン錠「KO」(2.5mg)
(麻)ナルサス錠(2mg)(6mg)(12mg)
ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠「サワイ」(2.5μg)
(麻)ナルラピド錠(1mg)(4mg)

— に —

ニコチン酸アミド散「ソッネ」10%
ニコランジル錠「サワイ」(5mg)
(院外)ニトロール錠(5mg)
(院外)ニトロールRカプセル(20mg)
ニトロペン舌下錠(0.3mg)
ニバジール錠(2mg)
ニフェジピンカプセル「サワイ」(5mg)
ニフェジピンL錠「サワイ」(10mg)
ニフェジピンCR錠「日医工」(20mg)(40mg)
ニフレック配合内用剤
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末
乳糖
ニューベクオ錠(300mg)
(院外)ニューロタン錠(25mg)(50mg)

— ね —

ネオオーラルカプセル(10mg)(25mg)
(院外)ネオオーラルカプセル(50mg)

ネオドパゾール配合錠(100mg)
(院外)ネキシウムカプセル(10mg)(20mg)
(限)ネクサパール錠(200mg)
ネシーナ錠(6.25mg)(25mg)
ネルボン錠(5mg)

— の —

(院外)ノイキノン錠(10mg)
ノイロトロピン錠(4単位)
(院外)ノウリアスト錠(20mg)
(院外)ノックピン原末
ノバミン錠(5mg)
ノベルジン錠(50mg)←削除:在庫限り(後発切替のため)
ノルバデックス錠(20mg)
ノルフロキサシン錠「サワイ」(100mg)
ノルレボ錠(1.5mg)

— は —

バイアグラ錠(50mg)
バイアスピリン錠(100mg)
(限)ハイドレアカプセル(500mg)
ハイペン錠(200mg)
(院外)バイロテンシン錠(10mg)
(院外)パキシル CR 錠(12.5mg)
(院外)バクシダール錠(100mg)
(院外)バクタ配合錠
バップフォー錠(10mg)
パナルジン錠(100mg)
(院外)バナシ錠(100mg)
ハーフジゴキシンKY錠(0.125mg)
バフセオ錠(150mg)
(院外)バフセオ錠(300mg)
バラクルード錠(0.5mg)
(院外)パリエット錠(10mg)
(毒)バリキサ錠(450mg)
バリテスタ-A240散
バルサルタン錠「Me」(80mg)
(院外)ハルシオン錠(0.25mg)
バルデナフィル錠(10mg)
バルトレックス錠(500mg)
(院外)ハルナールD錠(0.2mg)

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
パルモディア錠(0.1mg)
(院外)パルモディア XR 錠(0.2mg)(0.4mg)
パロキセチン OD 錠「トワ」(10mg)
パロス発泡顆粒S(5g)(3.5g)
バンコマイシン塩酸塩散「明治」(0.5g)
調剤用パンビタン末

— ひ —

PL顆粒(1g/包)
(院外)ピオフェルミン錠剤
ピオフェルミン配合散
(科限定)ピオフェルミンR散 ※小児科限定
ピカルタミド OD 錠「NK」(80mg)
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イキ」
ピコスルファートナトリウム錠「日医工」(2.5mg)
ピコプレップ配合内用剤
ビ・シフロール錠(0.125mg)
ビ・シフロール錠(0.5mg)
(院外)ヒスロンH錠(200mg)
ビソプロロールフマル酸塩錠「トワ」(0.625mg)(2.5mg)
ピタバスタチンCa・OD錠「トワ」(2mg)
ビタメジン配合カプセル(25mg)
ヒダントール F 配合錠
ピートル顆粒分包(250mg)
ビビアント錠(20mg)
ビフロキシ配合錠
ピモベンダン錠「TE」(1.25mg)
ビラノアOD錠(20mg)
ビラフトビカプセル(75mg)
ピラマイド原末
ピリドキサール錠「イセイ」(10mg)
ピレスパ錠(200mg)
(院外)ピンマックカプセル(61mg)

— ふ —

ファミビル錠(250mg)
ファモチジン OD錠「トワ」(10mg)(20mg)
(院外)(限)ファロム錠(200mg)
ファンギゾンシロップ100mg/mL

(院外)フィコンパ錠(2mg)	プレマリン錠(0.625mg)
フィナステリド錠「VTRS」(1mg)	プレミネント配合錠LD
ブイフェンド錠(50mg)	(院外)プロカテロール塩酸塩 DS 0.01%「効タ」
(院外)フェアストーン錠(40mg)	プロカテロール塩酸塩シロップ「日医工」(5µg/mL)
フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠「YD」(60mg)	→入荷困難のため処方不可(メブチンシロップで対応)
(院外)フェキソフェナジン塩酸塩 DS 5%「ト-7」	(限)プログラフ顆粒0.2mg→削除;在庫限り
フェノバル散10%	(院外)プロサイリン錠(20µg)
フェブキソスタット錠「DSEP」(10mg)(20mg)	プロスター錠(25mg)
(院外)フェブリック錠(10mg)(20mg)	プロスタグランジンE2錠(0.5mg)
(院外)フェマーラ錠(2.5mg)	(院外)プロセキソール錠(0.5mg)
フェロ・グラデュメット錠(105mg)	フロセミド細粒4%「EMEC」
フェロミア顆粒8.3%	フロセミド錠「NP」(10mg)(20mg)(40mg)
(院外)フェロミア錠(50mg)	ブロチゾラムOD錠「テバ」(0.25mg)
(院外)フォイパン錠(100mg)	プロテカジン OD 錠(10mg)
フォシーガ錠(5mg)(10mg)	プロナーゼMS散(2万単位/0.5g)
フォセベル錠(5mg)	(院外)プロプレス錠(4mg)(8mg)
(院外)フォゼベル錠(10mg)	プロベラ錠(2.5mg)
フォリアミン錠(5mg)	フロベン顆粒8%
ブスコパン錠(10mg)	(院外)プロマックD錠75
ブドウ糖	フロモックス小児用細粒10%
プラザキサカプセル(75mg)(110mg)	フロモックス錠(100mg)
フラジール内服錠(250mg)	フロリドゲル経口用2%(5g/本)
ブラダロン錠(200mg)	(限)フロリネフ錠(0.1mg)
プラノバル配合錠	— ^ —
(院外)プラビックス錠(25mg)(75mg)	(院外)ベイスンOD錠(0.2mg)(0.3mg)
フリウエル配合錠 LD「モチダ」	ベオーバ錠50mg
(院外)フリバス錠(50mg)(75mg)	ベザトールSR錠(200mg)
(院外)プリミドン細粒99.5%「日医工」	ベシケアOD錠5mg
(院外)プリンペラン錠(5mg)	ベージニオ錠(50mg)(100mg)(150mg)
(院外)フルイトラン錠(1mg)	ベタニス錠(25mg)(50mg)
フルイトラン錠(2mg)	ベタヒスチンメシル酸塩錠「JD」(6mg)
フルコナゾールカプセル「F」(100mg)	ベタメタゾン錠「サワイ」(0.5mg)
(院外)プルゼニド錠(12mg)	(院外)ベネット錠(75mg)
フルニトラゼパム錠「アム」(1mg)	ベニジピン塩酸塩錠「OME」(4mg)
ブルフェン錠(100mg)	(院外)ベプシドカプセル(25mg)
フレカイニド酢酸塩錠「VTRS」(50mg)	ベプリコール錠(50mg)
プレガバリン OD 錠「DSEP」(25mg)(75mg)	ヘモクロンカプセル(200mg)
(院外)プレタールOD錠(50mg)(100mg)	(院外)ベムリディ錠(25mg)
ブレディニン OD 錠(50mg)	ベラパミル塩酸塩錠「JG」(40mg)
プレドニゾン錠(1mg)(5mg)	ベラプロストNa錠「ト-7」(20µg)
プレドニゾン錠「NP」(2.5mg)	

ベリキューボ錠(2.5mg)

ベリチーム配合顆粒(1g/包)

ペルサンチン錠(25mg)

(院外)ペルサンチン錠(100mg)

(院外)ペルジピンLAカプセル(40mg)

ベルソムラ錠(15mg)

ヘルベッサ錠(30mg)

ヘルベッサ-Rカプセル(100mg)

ペンタサ錠(500mg)

ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)

— ほ —

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用

ボグリボースOD錠「日医工」(0.2mg)(0.3mg)

ボースデル内用液10

ホスミシンドライシロップ 40%

ホスミシン錠(250mg)

ホスリボン配合顆粒

(院外)ホスレノール OD 錠(250mg)

(院外)ボナロン錠(35mg)

ボナロン経口ゼリー35mg

(院外)ボノサップパック400

(院外)ボノピオンパック

ポラプレジック OD 錠(75mg)

(院外)ポララミン錠(2mg)

ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包(25g)

ポリフル細粒 83.3%(1.2g/包)

ポリフル錠(500mg)

ポルタレン錠(25mg)

ポルタレンSRカプセル(37.5mg)

(院外)ポンタールカプセル(250mg)

ポンタールシロップ3.25%

— ま —

マヴィレット配合錠

マーズレンS配合顆粒

マーズレン配合錠1.0ES

マイスタン細粒1%

(院外)マイスリー錠(5mg)

マグコロール散68%分包(50g)

マクサル錠(10mg)

(院外)マグミット錠(250mg)

マグミット錠(330mg)

(院外)マリセブ錠(25mg)(12.5mg)

— み —

(院外)ミオナール錠(50mg)

ミカムロ配合錠AP

(院外)ミカムロ配合錠BP

ミカルデイス錠(40mg)

(院外)ミグシス錠(5mg)

ミチグリニド Ca・OD 錠「JG」(10mg)

ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU

(院外)ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU

(院外)ミニリンメルト OD 錠(50µg)(120µg)

ミネプロ OD 錠(2.5mg)

ミノサイクリン塩酸塩錠「サワイ」(50mg)

ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)

(院外)ミノマイシン錠(50mg)

ミヤBM細粒(1g/包)

ミヤBM錠

ミルタザピン OD 錠「ト-7」(15mg)

ミンクリア内用散布液0.8%(20mL)※処置入力のみ可

内視鏡室のみに在庫

— む —

(院外)ムコスタ錠(100mg)

(院外)ムコソルバン錠(15mg)

(院外)ムコダイン錠(500mg)

(院外)ムコダインDS 50%

(院外)ムコダインシロップ5%

— め —

(院外)メイアクトMS錠(100mg)

メイアクトMS小児用細粒10%

メイラックス錠(1mg)

(院外)メインテート錠(0.625mg)(2.5mg)(5mg)

メキシチールカプセル(50mg)

メクトビ錠(15mg)

(院外)メジコン散10%

メジコン錠

メジコン配合シロップ

(限)メソトレキセート錠(2.5mg)
メチコパール錠(500μg)
(院外)メチルエルゴメトリン錠「あすか」(0.125mg)
メチルドパ錠ツルハラ(250mg)
(院外)メトグルコ錠(250mg)
メトクロプラミド錠「NIG」(5mg)
メトホルミン塩酸塩錠 MT「DSEP」(250mg)
メトリジンD錠(2mg)
メドロール錠(4mg)
メネシット配合錠(100mg)
メパロチン錠(10mg)
メプチンミニ錠(25μg)
メプチンシロップ 5μg/mL→後発のプロカテロール塩酸塩シロップが安定供給にもどれば「院外のみ採用」に変更予定
(院外)メモリーOD錠(5mg)
(院外)メモリーOD錠(10mg)
メマンチン塩酸塩 OD 錠「ケミファ」(5mg)(10mg)
(院外)メリスロン錠(6mg)
メルカゾール錠(5mg)

— も —

モサプリドクエン酸塩錠「日医工」(5mg)
(院外)モービック錠(10mg)
(院外)モニラック・シロップ65%(10ml/包)
モビコール配合内用剤 LD
モビプレップ配合内用剤
(限)(麻)モルヒネ塩酸塩錠「DSP」(10mg)
(限)(麻)(毒)モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末

— や —

薬用炭

— ゆ —

ユーエフティ配合カプセルT100(100mg)
(院外)ユーエフティE配合顆粒 T100(100mg/包)
(院外)ユーエフティE配合顆粒 T200(200mg/包)
ユーゼル錠(25mg)
ユービット錠(100mg)
ユーロジン錠(2mg)
ユナシン錠(375mg)

ユニシア配合錠HD
ユベラ錠(50mg)
ユベランソフトカプセル(200mg)
ユリス錠(1mg)
ユリノーム錠(25mg)
(院外)ユリーフ OD 錠(4mg)

— よ —

(院外)ヨクイニンエキス錠「コタロー」

— ら —

(院外)ラキソベロン錠(2.5mg)
(院外)ラキソベロン内用液 0.75%(10ml/本)
ラクツロースシロップ65%「効効」
(院外)ラコール NF 配合経腸用液(200mL) ミルク
ラコール NF 配合経腸用液(200mL) ハナナ
(限)ラコール NF 配合経腸用半固形剤
(院外)ランシックス錠(20mg)(40mg)
ラジレス錠(150mg)
ラックビー微粒N
ラニラピッド錠(0.05mg)
ラベプラゾール Na 塩錠「明治」(10mg)
ラミクタール錠(25mg)
ラミシール錠(125mg)
ラメルテオン錠「サワイ」(8mg)
ランソプラゾールOD錠「武田テバ」(15mg)
ランドセン細粒0.1%
(院外)ランドセン錠(0.5mg)

— り —

リアルダ錠(1200mg)
リーゼ錠(5mg)
リーバクト配合顆粒(4.15g/包)
リウマトレックスカプセル(2mg)
リオナ錠250mg
(院外)リオベル配合錠 HD
(院外)リオベル配合錠LD
リオレサール錠(5mg)
(院外)リクシアナOD錠(15mg)
リクシアナOD錠(30mg)(60mg)
リザベン細粒 10%

リザベンカプセル(100mg)
リスペリドン内用液分包「アムル」(0.5mg/0.5mL)
(限)リスペリドン OD 錠「アムル」(2mg)
リスミー錠(2mg)
(院外)リズミック錠(10mg)
リスモダンR錠(150mg)
リセドロン酸 Na 錠「ト-7」(75mg)
リネゾリド錠「サワイ」(600mg)
リパクレオン顆粒300mg分包
(院外)リバゼブ配合錠 LD
(院外)リバロ錠(2mg)
(院外)リピディル錠(80mg)
(院外)リピトール錠(5mg)(10mg)
リファンピシカプセル「サント」(150mg)
リフキシマ錠(200mg)
(院外)リフレックス錠(15mg)
リベルサス錠(3mg)(7mg)
(院外)リベルサス錠(14mg)
リボトリール錠(1mg)
リポバス錠(5mg)
リマチル錠(100mg)
リマプロスタアルファデクス錠「日医工」(5μg)
リムパーザ錠(100mg)(150mg)
(院外)リリカ OD 錠(25mg)(75mg)
リンゼス錠(0.25mg)
(院外)リンデロン錠(0.5mg)

— る —

(院外)ルセフィ錠(2.5mg)(5mg)
(院外)ルナベル配合錠LD
(院外)ルナベル配合錠ULD
ルネスタ錠(2mg)
(院外)ルパフィン錠(10mg)
ルブラック錠(4mg)
(院外)ルブラック錠(8mg)
ルーラン錠(4mg)

— れ —

(院外)レイボー錠(50mg)(100mg)
(院外)レキップ CR 錠(2mg)(8mg)
レクサプロ錠(10mg)

(院外)レグバラ錠(25mg)
レザルタス配合錠HD
レスタミンコーワ錠(10mg)←削除;在庫限り
レスピア静注・経口服液(60mg)
レットヴィモカプセル(40mg)(80mg)
レトロゾール錠「NK」(2.5mg)
レナジェル錠(250mg)
(院外)レニベース錠(2.5mg)(5mg)
レバミピド錠「サワイ」(100mg)
レベチラセタム DS 50%「サワイ」
レベチラセタム錠「サワイ」(500mg)
レボカルニチン塩化物錠「ト-7」(100mg)
レボセチリジン塩酸塩 DS 0.5%「効効」(0.25g/包)
(院外)レボセチリジン塩酸塩 OD 錠「効効」(2.5mg)
レボトミン錠(5mg)
レボフロキサシン錠「DSEP」(250mg)
(院外)レミッチ OD 錠(2.5μg)
レミニールOD錠(8mg)
レルパックス錠(20mg)
レルミナ錠(40mg)
(院外)レンドルミンD錠(0.25mg)
レンビマカプセル(4mg)(10mg)

— ろ —

ロイケリン散 10%
ロイコン錠(10mg)
(限)ロイコボリン錠(5mg)
ロカルトロールカプセル(0.25μg)
(院外)ロキソニン錠(60mg)
ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン Na 錠「ト-7」(60mg)
ロケルマ懸濁用散分包(5g/包)
(院外)ロスーゼット配合錠 LD
(院外)ローコール錠(20mg)
ロサルタンカリウム錠「ト-7」(25mg)(50mg)
ロスバスタチン OD 錠「ト-7」(2.5mg)(5mg)
(院外)ロゼレム錠(8mg)
(院外)ロトリガ粒状カプセル(2g/包)
ロペミンカプセル(1mg)
ロラゼパム錠「サワイ」(0.5mg)
(院外)ロンゲス錠(10mg)

ロンサーフ配合錠 T15

ロンサーフ配合錠 T20

— わ —

ワーファリン錠(0.5mg)(1mg)

(限)ワーファリン錠 (5mg)

ワイドシリン細粒20%(200mg/g)

(院外)ワソラン錠(40mg)

(院外)ワンアルファ錠(0.25 μ g)

ワントラム錠(100mg)

注 射 薬

— あ —

アイリーア硝子体内注射用キット(40mg/mL)
アイリーア8mg硝子体内注射用キット(114.3mg/mL)
アキネトン注射液0.5%(1mL)
(限)アクテムラ点滴静注用(80mg)
(毒)アクブラ静注用(10mg)(100mg)
アコアラン静注用600
アシクロビル点滴静注液「トーフ」(250mg/10mL)
アスパラギン酸カリウム注10mEq キット「テルモ」(10mL)
アセリオ静注液パック(1000mg/100mL)
アセレンド注(100 μ g/2mL)
アタラックスP注射液(25mg/1mL)
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」(60mg/20mL)
アデホスLコーワ注(20mg/2mL)
アデラビン9号注(2mL)
アドナ注(静脈用)(25mg/5mL)(50mg/10mL)
アトニンO注(5単位/1mL)
アドリアシン注用10(10mg)←供給不安定のため一時的に
後発切替、供給安定次第復活予定
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フー」(1mL)
アトワゴリバース静注シリンジ(6mL)
(限)アナフラニール点滴静注液(25mg/2mL)
アネメトロ点滴静注液(500mg/100mL)
アバスチン点滴静注用(100mg/4mL)(400mg/16mL)
アービタックス注射液(100mg/20mL)(500mg/100mL)
(毒)アブラキサ点点滴静注用(100mg)
アミオダロン塩酸塩静注(150mg/3mL)「TE」
アミカシン硫酸塩注射液「明治」(100mg)
アミサリン注(200mg/2mL)
アミゼットB輸液
アミノレバン点滴静注(500mL)
(限)(毒)アムビゾーム点滴静注用(50mg)
アリナミンF注(50mg/20mL)
アリムタ注射用(100mg)(500mg)
アルギニン点滴静注10%(300mL)
アルツディスポ関節注(25mg/2.5mL)

アルブミン-25%静注(12.5mg/50mL)
アルプロスタジルアルファデクス注射用「効々」(20 μ g)
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用「効々」(500 μ g)
アレビアチン注250mg(5mL)
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩
酸塩
アロカリス点滴静注(235mg)
アンチレクス静注(10mg/1mL)

— い —

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)
イオパミドール300注(20mL)(50mL)「F」
イオパミドール300注シリンジ(80mL)(100mL)「F」
イオパミドール370注シリンジ(100mL)「F」
イオパミロン注300シリンジ(100mL)
イオパミロン370(20mL)(100mL)
イオパミロン370シリンジ(100mL)
イオヘキソール350注(20mL)(50mL)(100mL)「F」
イオメロン350注(100mL)
イオメロン300シリンジ(75mL)
イオメロン350シリンジ(135mL)
イーケプラ点滴静注(500mg)←後発切り替え;在庫限り
イジユド点滴静注(25mg)(300mg)
イソゾール注射用(0.5g)
イソビスト注240(10mL)
イデルビオン静注用(500)(1000)(2000)(3500)
イベニティ皮下注105mgシリンジ
注射用イホマイド(1g)
イミグランキット皮下注(3mg)
イミフィンジ点滴静注(120mg)(500mg)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」
(40mg/2mL)(100mg/5mL)←削除:販売中止のためメーカー
変更
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーフ」(40mg/2mL)(100
mg/5mL)
インジゴカルミン注0.4%(20mg/5mL)
(院外)インスリングルルギンBS注ミリオペン(300単位/3mL)
(限)インダシン静注用(1mg)
イントラリポス輸液20%(100mL)(250mL)
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」(100mg)

— う —

ヴィーン D 輸液 (500mL)
ヴィーン F 輸液 (500mL)
ヴィーン 3G 輸液 (500mL)
(限) 献血ヴェノグロブリン-IH10% 静注 (5g/50mL)
ウパシタ静注透析用25 µg シリンジ
ウパシタ静注透析用100 µg シリンジ
ウロナーゼ静注用「持田」(6万単位)
ウログラフィン注60% (20mL)
ウログラフィン注76% (20mL)
ウロミテキサン注(100mg/1mL) (400mg/4mL)

— え —

乾燥HBグロブリンーニチヤク(200単位/1mL)
エクザール注射用(10mg)
エクストラニール腹膜透析液 UV ツインバック(1. 5L)
エクストラニール腹膜透析液 UV ツインバック(2L)※院内のみ
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ(1. 5L)
エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ(2L)※院内のみ
HMG注用150単位「あすか」
HMG注射用75単位「F」
HMG注射用150単位「F」
エダラボン点滴静注液/バッグ「NP」(30mg)
エトポシド点滴静注「NIG」(100mg)
エピペン注射液(0. 15mg) (0. 3mg)
エピルピシン塩酸塩注射用「NK」(10mg) (50mg)
エフェドリン注射液4% (40mg/1mL)
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エポジン皮下注シリンジ24000
エホチール注射液1% (10mg/1mL)
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
LH-RH注(0. 1mg/1mL)
エルシトニン注20Sディスポ(1mL)
エルシトニン注(40単位/1mL)
エルネオパ NF1号輸液(1000mL)
エルネオパ NF2号輸液(1000mL) (1500mL)
エレジェクト注シリンジ(2mL)
塩化ナトリウム注射液10%(大塚食塩注10%) (20mL)
塩化Na補正液 2. 5mEq/ml(20mL)
(科限定)エンハーツ点滴静注用(100mg)※腫瘍内科限定

塩プロ注1%(50mg/5mL)
エンドキサン[注射用](100mg) (500mg)

— お —

(毒)オキサリプラチン点滴静注液「ホスピラ」(50mg) (100mg)
(麻)オキファスト注(10mg) (50mg)
オクトレオチド酢酸塩皮下注「サンド」(100 µg/1mL)
オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg
オゼンピック皮下注(2mg)
オニバド点滴静注43mg
オノアクト点滴静注用(50mg)
オビソート注射用(0. 1g)
オブジーボ点滴静注(120mg) (240mg)
オプチレイ240注シリンジ(100mL)
オムニパーク300(100mL)
オムニパーク300シリンジ(100mL) (150mL)
オメプラゾール注用「TYK」(20mg)
オーラ注歯科用カートリッジ(1. 8mL)
オルダミン注射用(1g)
(限)オールドレブ点滴静注用(150mg)
オンコビン注射用(1mg)

— か —

カイトリル注(1mg/1mL)
カーミパック生理食塩液BAG(1. 3L)「テルモ」
ガスター注射液(20mg)
カタクロット注射液(40mg)
カドサイラ点滴静注用(100mg) (160mg)
ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」(100mg) (500mg)
カルセド注射用(20mg) (50mg)
カルチコール注射液(5mL)
ガドピスト静注1. 0mol/L シリンジ(5mL) (10mL)
カルボカインアンプル注1% (10mL)
カルボカインアンプル注2% (5mL)
(毒)カルボプラチン点滴静注液(150mg) (450mg)
乾燥マムシ馬抗毒素6000単位

— き —

キイトルーダ点滴静注(100mg)
(限)キシロカイン0. 5%筋注用溶解液(3mL)

キシロカイン注射液E1%(20mL)
静注用キシロカイン2%(100mg/5mL)
キシロカイン注ポリアンブ1%(5mL)
キシロカイン注ポリアンブ2%(5mL)
キュビシン静注用(350mg)
強力ネオミノファーゲンC静注シリンジ(20mL)
キロサイド注(20mg)
キンダリー液AF-4号(6L)
キンダリー液AF-4P号(10L)

— < —

(限)(科限定)グラニセトロン静注液「サワイ」(3mg)
※小児科限定
グラニセトロン点滴静注液バッグ(3mg/100mL)
クラフオラン注射用(0.5g)
グリセオール注(200mL)
クリンダマイシンリン酸エステル注射液「NIG」(600mg)
グルアセト35注(500mL)
グルカゴンG・ノボ[注射用](1mg)
グルトパ注(600万)(1200万)
クレキサン皮下注キット(2000IU/0.2mL)
グロブリン筋注「JB」(450mg/3mL)(1500mg/10mL)
献血グロベニン-I静注用(2500mg)

— け —

KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)
ケイセントラ静注用(500)(1000)
ケイツーN注(10mg/2mL)
(麻)ケタラール静注用(50mg/5mL)
(限)(麻)ケタラール筋注用(500mg/10mL)
ケナコルト-A[筋注用](40mg/1mL)
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」(200mg)(1g)
ゲンタシン注(10mg/1mL)(60mg/1.5mL)

— こ —

抗D人免疫グロブリン筋注用「JB」(1000倍)
コアベータ静注(12.5mg)
コスメゲン静注用(0.5mg)
コートロシン注射用(0.25mg)

ゴナックス皮下注用 溶解液付(80mg)(120mg)(240mg)
ゴナトロピン筋注用(3000単位)
ゴナトロピン注用(5000単位)
(限)ゴナールエフ皮下注ペン(300国際単位/0.5mL)
コントミン筋注(25mg/5mL)

— さ —

サイラムザ点滴静注液(100mg)(500mg)
サイレース静注(2mg/1mL)
ザノサー点滴静注用(1g)
サビーン点滴静注用(500mg)
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)
サムタス点滴静注用(8mg)
ザルトラップ点滴静注(100mg)(200mg)
サンドスタチンLAR筋注用キット(30mg)
サンリズム注射液50(50mg/5mL)

— し —

ジアグノグリーン注射用(25mg)
(限)シアノコバラミン注射液「ト-7」(1000 μ g)
ジェントロピンTC注用(5.3mg)
ジェントロピンTC注用(12mg)
(毒)ジェブタナ点滴静注(60mg/1.5mL)
ジェムザール注射用(200mg)(1g) ← 削除:在庫限り(販売中止のため)
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ(1.8mL)
ジギラノゲン注(0.4mg/2mL)
(毒)シスプラチン点滴静注(10mg)(50mg)「マルコ」
ジスロマック点滴静注用(500mg)
シチコリン注「NP」(500mg/2mL)
シナジス筋注液(50mg)(100mg)
シプロフロキサシン点滴静注液(400mg)「ニプロ」
シベクトロ点滴静注用(200mg)
シベノール静注(70mg/5mL)
シベレスタットNa点滴静注用「ニプロ」(100mg)
ジョイクル関節注(30mg)
ジーラスタ皮下注(3.6mg)
ジルチアゼム塩酸塩注射液「サワイ」(10mg)(50mg)
シンビット静注用(50mg)

— す —

(毒)スキサメトニウム注100「マルイシ」(2%/5mL)
スルバシリン静注用(1.5g)(3g)
スロンノンHI注(10mg/2mL)

— せ —

(限)生食注シリンジ「オーツカ」20mL
生食注シリンジ「NP」(5mL)※生食ロック用
生理食塩液(20mL)(50mL)
生理食塩液BAG(100mL)(500mL)「テルモ」
生理食塩液キットH(100mL)
大塚生食注(ソフトバッグ)(250mL)
生理食塩液洗浄 細口(500mL)
大塚生食注 広口(1000mL)※処置入力のみ可
内視鏡室のみに在庫
生理食塩液PL「フソー」(2L)
セファゾリンNa点滴静注用バッグ「オーツカ」(1g)
セファゾリンナトリウム注射用「日医工」(0.5g)(1g)(2g)
(限)(院外)セファメジンα点滴用キット(2g)※在宅用
セファランチン注(10mg/2mL)
セフェピム塩酸塩静注用「サンド」(1g)
セフォチアム塩酸塩点滴静注用バッグ「NP」(1g)
セフトラジウム静注用「VTRS」(1g)
セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」(1g)
セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ「NP」(1g)
セフメタゾールNa静注用「NP」(1g)
セルシン注射液(10mg/2mL)←削除:在庫限り(販売中止)
セレネース注5mg(1mL)

— そ —

ソセゴン注射液(15mg/1mL)
ソナゾイド注射用
ソマチユリン皮下注120mg
ゾラデックスLAデポ(10.8mg)
ゾラデックスデポ(3.6mg)
(限)ソリリス点滴静注(300mg)
ソルコーテフ注射用(100mg)
ソルダクトン静注用(100mg)(200mg)
(院外)ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

ソル・メドロール静注用(40mg)(125mg)(500mg)
ゾレドロン酸点滴静注用(4mg/5mL)「サンド」

— た —

ダイアモックス注射用(500mg)
ダウノマイシン静注用(20mg)
タゾピペ配合静注用「明治」(2.25g)(4.5g)
タゾピペ配合点滴静注用バッグ「ニフロ」(4.5g)
タチオン注射用(200mg)
ダルテパリンNa 静注3000単位/12mL シリンジ「ニフロ」
ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KKF」(5μg)(10μg)(15μg)(20μg)(30μg)(40μg)(60μg)(120μg)
ダントリウム静注用(20mg)

— ち —

チエナム点滴静注用キット(0.5g)
注射用水(20mL)(500mL 光ソフトバッグ)
注射用フサン50
大塚蒸留水(100mL)
大塚蒸留水 広口(500mL)
チラーゼン S 静注液(200μg/1mL)
沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL

— つ —

ツベルクリン[精製](1人用)(0.25μg)

— て —

TRH注「タナベ」(0.5mg/1mL)
テイコプラニン点滴静注用「明治」(400mg)
1%ディプリバン注キット(500mg/50mL)
低分子デキストラン糖注(500mL)←在庫なくオーダー不可。次回薬審にて削除予定
デカドロン注射液(3.3mg/1mL)(6.6mg/2mL)
テセントリク点滴静注(840mg)(1200mg)
テタノブリン筋注用(250単位)
デトキソール静注液(2g/20mL)
(毒)デノシン点滴静注用(500mg)
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
デュピクセント皮下注300mgシリンジ

— と —

ドキシル注(20mg/10mL)
ドキソルピシン塩酸塩注射液「NK」(10mg)
(毒)ドセタキセル点滴静注用「ニフロ」(20mg)(80mg)
ドパストン静注(50mg/20mL)
ドパミン塩酸塩点滴静注液「NP」(100mg/5mL)
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」
(200mg/200mL)
ドパミン塩酸塩点滴静注液キット「VTRS」
(600mg/200mL)
ドプラム注射液400mg
ドブタミン点滴静注液「VTRS」(100mg/5mL)
ドブタミン点滴静注液キット「VTRS」(600mg/200mL)
トラスズマブ BS 点滴静注用「NK」(60mg)(150mg)
トラベルミン注(30mg/1mL)
トランサミン注10%(1000mg/10mL)
トランサミン注5%(250mg/5mL)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
ドルミカム注射液(10mg/2mL)
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液(25mg/10mL)

— な —

(麻)ナルベイン注(2mg/1mL)
ナロキソン塩酸塩静注「AFP」(0.2mg/1mL)

— に —

ニコランジル点滴静注用「サワイ」(48mg)
(毒)ニトプロ持続静注液(6mg/2mL)
(科限定)ニトログリセリン静注「TE」(1mg/2mL)
※婦人科・麻酔科限定
ニトログリセリン点滴静注「TE」(50mg/100mL)
ニトロール注(5mg/10mL)
(限)ニューモバックス NP シリンジ(0.5mL)

— ね —

ネオアミュー輸液(200mL)
ネオシネジンコーワ注(1mg/1mL)
ネオビタカイン注シリンジ(5mL)
ネオフィリン注(250mg/10mL)

— の —

ノイロジン注(100μg)
ノイロロピン注射液(3mL)
(限)ノボラピッド注フレックスタッチ
※フレックスタッチ入荷困難の為、「限定」扱い
ノボラピッド注フレックスペン
(限)ノボラピッド注ペンフィル(300単位/3mL)
ノルアドリナリン注(1mg/1mL)
献血ノンスロン1500注射用(1500単位)

— は —

パージェタ点滴静注(420mg/14mL)
ハーセプチン注射用(60mg)(150mg)
ハイカムチン注射用(1.1mg)
ハイカリック液RF(500mL)
(限)ハイゼントラ20%皮下注(4g/20mL)
バクトラミン注
(毒)パクリタキセル注(30mg/5mL)
(100mg/16.7mL)
パーサビブ静注透析用シリンジ(5mg)
(科限定)パドセブ点滴静注用(20mg)(30mg)
※腫瘍内科限定
パパベリン塩酸塩注射液(40mg/1mL)
バビースモ硝子体内注射液120mg/mL
(限)ハプトグロビン静注2000単位「JB」
バベンチオ点滴静注(200mg/10mL)
パム静注2.5%(500mg/20mL)
(毒)ハラヴェン静注(1mg/2mL)
バル筋注「AFP」(100mg)
パレプラス輸液(500mL)
パロノセトロン点滴静注バッグ「タイウ」(0.75mg/50mL)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「VTRS」(0.5g)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「VTRS」(1.0g)
パントール注射液(500mg/2mL)
ハンブ注射用(1000μg)

— ひ —

ビーフリード輸液(500mL)
ビームゲン注(5μg/0.25mL)(10μg/0.5mL)
ビカーボン輸液(500mL)
ビクシリン注射用(0.5g)(1.0g)
ビクトーザ皮下注 18mg

(限)ピシバニール注射用1KE
 ピシバニール注射用5KE
 ビジパーク270注(20mL)
 ビスダイン静注用(15mg)
 ビタミンC注(500mg/2mL)
 ビタメジン静注用
 ピトレシン注射液(20単位/1mL)
 (科限定)ヒドロコルチゾンコハク酸エステル Na 注射用「NIG」
 (100mg) ※小児科限定
 ピノルピン注射用(10mg)(20mg)(30mg)
 ピペラシリンナトリウム注射用「NIG」(1g)(2g)
 ヒューマリンR注 U-100(1000単位/10mL)
 ヒューマリンR注ミリオペン
 ヒューマログ注ミリオペン HD
 ヒューマログミックス25注ミリオペン
 (院外)ヒューマログミックス50注ミリオペン
 ビリスコピン点滴静注50(100mL)
 ビロイ点滴静注用(100mg)

— ふ —

ファーストシン静注用(1g)バイアル
 ブイフェンド静注用(200mg)
 フィブリノゲン HT 静注用「JB」(1g)
 フィルグラスチムBS注シリンジ「モチダ」(75 µg)
 フェインジェクト静注(500mg)
 フェジン静注(40mg/2mL)
 フェノバル注射液(100mg/1mL)
 フェソロデックス筋注(250mg)
 (麻)フェンタニル注射液(0.1mg/2mL)
 (0.25mg/5mL)
 フォリルモンP注(75単位)(150単位)
 フォルテオ皮下注キット(600 µg)
 ブスコパン注(20mg/1mL)
 大塚糖液10%(500mL)
 20%ブドウ糖注射液(20mL)
 5%ブドウ糖注射液(20mL)
 大塚糖液5%(500mL)
 テルモ糖注5%(100mL)(250mL)
 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(20mL)
 大塚糖液50%(200mL)
 大塚糖液70%(350mL)

ブラリア皮下注60mgシリンジ
 ブリディオ静注(200mg/2mL)
 ブリンペラン注射液(10mg/2mL)
 フルオレサイト静注(500mg/5mL)
 フルオロウラシル注「ト-ワ」(250mg/5mL)(1000mg/20mL)
 フルマゼニル静注液「テバ」(0.5mg)
 フルマリン静注用(1g)
 プレアミン-P注射液(200mL)
 ブレオ注射用(5mg)(15mg)
 プレセデックス静注液(200 µg/2mL)
 水溶性プレドニン(10mg)(20mg)
 ブレビブロック注(100mg/10mL)
 プロイメンド点滴静注用(150mg)←削除;在庫限り
 プロゲデポー筋注(125mg/1mL)
 プロジフ静注液(100mg/1.25mL)(400mg/5mL)
 プロスタルモンF注射液(1000 µg/1mL)
 フロセミド注「ト-ワ」(20mg)
 プロタノールL注(0.2mg/1mL)
 プロタミン硫酸塩静注「モチダ」(100mg)
 プロテアミン12注射液(200mL)
 プロハンス静注(5mL)
 プロハンス静注シリンジ(13mL)
 プロポフォール静注1%50mL「マルシ」
 ブロムヘキシン塩酸塩注射液「タイヨー」(4mg)
 (限)静注用フローラン(1.5mg)

— へ —

ベイフォータス筋注50mgシリンジ
 ベイフォータス筋注100mgシリンジ
 ベオビュ硝子体内注射用キット(120mg/mL)
 ベクティビックス点滴静注(100mg)(400mg)
 (麻)ペチジン塩酸塩注射液「タタ」(35mg)
 ベナンボックス注用300mg
 注射用ペニシリンGカリウム100万単位
 献血ベニロン-I 静注用(500mg/10mL)
 (2.5g/50mL)(5g/100mL)
 ベバシズマブ BS 点滴静注「第一三共」(100mg)(400mg)
 ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ(5千単位/0.2mL)「モチダ」
 ヘパリンナトリウム注N(5000単位/5mL)

ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」(10mL)
ヘパリンNa透析用250単位/mL シリンジ「ニプロ」(20mL)
ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ「ニプロ」(20mL)
ヘブスブリンーIH静注 1000単位(5mL)
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ(0.25mL)(0.5mL)
ペルジピン注射液(2mg/2mL)(10mg/10mL)

— ほ —

ホストイン静注(750mg)
ホスミンS静注用(1g)
(毒)ポトックス注用(50単位)(100単位)
ボナロン点滴静注バッグ(900 μ g/100mL)
ポプスカイン0.5%注(50mg/10mL)
ポプスカイン0.25%注バッグ(250mg/100mL)
ポララミン注0.5%(5mg/1mL)
ホリゾン注射液(10mg/2mL)
ボルベン輸液6%(500mL)
(限)ボンビバ静注1mgシリンジ

— ま —

マーカイン注0.5%(20mL)
マーカイン注脊麻用 高比重0.5%(4mL)
マーカイン注脊麻用 等比重0.5%(4mL)
マイトマイシン注用(2mg)
(毒)マイトマイシン注用(10mg)
マキサカルシトール静注透析用「ニプロ」(2.5 μ g)(5 μ g)
マキュエイド眼注用(40mg)
マグセント注100mL
マグネスコープ静注38%シリンジ(15mL)
マルタミン注射用
(院外)マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンニットールS注射液

— み —

ミカファンギン Na 点滴静注用「明治」(50mg)
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」(100mg)
ミラクリッド注射液(5万単位/1mL)
ミリプラ動注用(70mg)
ミリプラ用懸濁用液4mL

ミルセラ注シリンジ(12.5 μ g)(25 μ g)(50 μ g)(75 μ g)(100 μ g)(150 μ g)(200 μ g)
ミルリノン注22.5mgバッグ「効タ」(150mL)

— む —

*無水エタノール注

— め —

メイロン静注7%(20mL)
メイロン静注8.4%(250mL)
メソトレキセート点滴静注液(200mg/8mL)
メソトレキセート点滴静注液(1000mg/40mL)
メソトレキセート注射用(5mg)(50mg)
メチコパール注射液(500 μ g/1mL)
メチルエルゴメトリン注「あすか」(0.2mg/1mL)
メルカゾール注10mg
メロペネム点滴静注用バッグ「明治」(1g)
※2024.4月～一時的に処方マスタ止(入荷困難のため)
メロペネム点滴静注用「明治」(0.5g)(1g)
(限)メンクアッドフィ筋注

— も —

(麻)モルヒネ塩酸塩注射液10mg「三共」1%(1mL)
(麻)モルヒネ塩酸塩注射液「タケダ」(50mg)
(麻)モルヒネ塩酸塩注射液「シオノギ」(200mg)

— や —

ヤーボイ点滴静注液(50mg)

— ゆ —

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g

— よ —

(毒)ヨンドリス点滴静注用(0.25mg)(1mg)

— ら —

ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位)
ラクテック注(500mL)
ラクテックG注(500mL)
ランックス注(100mg/10mL)

ラスリテック点滴静注用(1. 5mg)(7. 5mg)
ラニズマブ BS 硝子体内注射用キット(10mg/mL)
ラピアクタ点滴静注液パック(300mg/60mL)
ラントス XR 注ソロスター(450単位/1. 5mL)
ランマーク皮下注(120mg)

— り —

リクラスト点滴静注液(5mg/100mL)
リコモジュリン点滴静注用12800
リツキシマブ BS 点滴静注「KHK」(100mg/10mL)(500mg/50mL)
リドカイン点滴静注液1%「効効」(200mL)
リトドリン塩酸塩点滴静注液「日医工」(50mg/5mL)
リネゾリド点滴静注「HK」(600mg/300mL)
リピオドール480注(480mg/10mL)
リブタヨ点滴静注(350mg)
リプルキット注10 μ g(2mL)
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)
(限)リユープリン注射用(1. 88mg)
リユープリンSR注射用キット(11. 25mg)
リユープリンPRO注射用キット(22. 5mg)
リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」
(1. 88mg)(3. 75mg)
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL(20mL)
リンデロン注(2mg/0. 5mL)

— る —

— れ —

レギュニール Hca 1. 5腹膜透析液 UV ツインバック
(1L)(1. 5L)(2L)
レギュニール Hca 1. 5腹膜透析液シングルバック
(2. 5L)(5L)
レギュニール Hca 2. 5腹膜透析液 シングルバック
機器専用(2. 5L)(5L)
レギュニール Hca 2. 5腹膜透析液 UV ツインバック
(1. 5L)
レスピア静注・経口液(60mg)
レパーサ皮下注 140mgペン
(向)レペタン注(0. 2mg/1mL)

レベチラセタム点滴静注「アム」(500mg/5mL)
レベミル注フレックスペン(300単位)
レボカルニチンFF静注シリンジ「ニフロ」(1000mg)
レボフロキサシン点滴静注「DSEP」(500mg/100mL)
レボホリナート点滴静注用(25mg)(100mg)
(麻)レミフェンタニル静注用「第一三共」(2mg)

— ろ —

ロイナーゼ注用 5000K 単位
ロイコボリン注(3mg/1mL)
(毒)ロクロニウム臭化物静注液「マルシ」(50mg/5mL)
(毒)ロゼウス静注液(10mg/1mL)
ロピオン静注(50mg/5mL)

— わ —

(限)ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ
※供給不安定のため
YDソリターT1号輸液(200mL)(500mL)
YDソリターT3号輸液(200mL)(500mL)
ワゴスチグミン注(0. 5mg/1mL)
ワソラン静注5mg

外用薬

— い —

— あ —

(約束)RZ
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)
アイベータ配合点眼液(5mL/本)
(院外)アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)
亜鉛華デンブ
亜鉛華単軟膏10%
アクアチム軟膏1%(10g/本)
アクアチムローション1%
アクトシン軟膏3%(30g/本)
(院外)アジマイシン点眼液1%(2.5mL/本)
アズノールうがい液4%(10mL/本)
アズノール軟膏
アスプールの液 0.5%
アセトアミノフェン坐剤小児用「JG」(100mg)(200mg)
(約束)アセモローション
(院外)アゾルガ配合懸濁性点眼液
アドエア50エアゾール120吸入用
(院外)アドエア100ディスカス60吸入用
アドエア250ディスカス 60吸入用
アドエア500ディスカス 60吸入用
(院外)アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アトロピン点眼液1%(5mL/本)
アトロベントエロゾル20 μ g
(院外)アニユイティ100 μ g エリプタ30吸入用
(院外)アノーロエリプタ7吸入用
アノーロエリプタ30吸入用
アラセナA軟膏3%(5g/本)
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルト原末
アルメタ軟膏0.1%(5g/本)
(院外)アレサガテープ(4mg/枚)
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)
(院外)アンヒバ坐薬(100mg)(200mg)
(麻)アンペック坐剤(10mg)(20mg)(30mg)

イオウ(精製)(山田)
(院外)イソジン液10%(250mL/本)
(約束)イソジン50倍液(500mL/本)
(院外)イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イソジンクリーム産婦人科用5%(250g/本)
(約束)イソジングリセリン
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
イナビル吸入粉末剤(20mg)
イミグラン点鼻液20(0.1mL)
イムノブラダー膀胱用(40mg)(80mg)
インターール吸入液 1%(2mL)

— う —

ウルティプロ吸入用カプセル
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)

— え —

(院外)エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)
(院外)エイベリス点眼液0.002%
エキザルベ (5g/本)
(約束)液状フェノール(5mL) 滅菌済アンプル
(院外)エクラープラスター(20 μ g/cm²)
(院外)エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)
エスクレ坐薬(250mg)(500mg)
エストラーナテープ(0.72mg/枚)
エストリール膣錠(0.5mg)
SPトローチ「明治」(0.25mg)
エタノール
(約束)HP
(約束)NH
エネマスター注腸散
エムラクリーム
エムラパッチ ※院内のみ採用(処置入力のみ可能)
(院外)エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
(約束)LH
塩化ナトリウム(食塩)
(約束)3%塩化ナトリウム吸入液
(約束)3%塩化ナトリウム点眼液

— お —

オイラックスクリーム10%(10g/本)
オイラックスHクリーム(5g/本)
オキサロール軟膏(10g/本)
オキシテトラコーン歯科用挿入錠(5mg)
オキシドール
オキナゾール錠600mg
オゼックス点眼液0.3%(5mL/本)
オペガン1.1眼粘弾剤
(院外)オラビ錠口腔用50mg
オリブ油
(院外)オルガドロン点眼・点耳・点鼻液(5mL/本)
(院外)オルテクサー口腔用軟膏0.1%(5g)
(院外)オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用

— か —

(院外)ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)
カチリ「ヨシタ」
カデックス軟膏分包(45mg)
(院外)カルプロニウム塩化物外用液5%(30mL/本)

— き —

キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)
キシロカイン液4%(100mL/本)
キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)
キシロカインゼリー2%(30mL/本)
逆性石ケン液0.025%(500mL)
キューバール100エアゾール(15mg)
キューバール50エアゾール(7mg)

— く —

(院外)グラアルファ配合点眼液(5mL/本)
グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)
(院外)クラビット点眼液1.5%(5mL/本)
グリセリン
グリセリン浣腸「オヲ」小児用(30mL/本)
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL/本)(150mL/本)
グリセリンBC液60%「ケンエー」

(院外)クレナフィン爪外用液10%
クロマイ錠(100mg)
クロマイP軟膏(25g/本)
(院外)クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」
クロロマイセチン局所用液5%(50mg/1mL)

— け —

(院外)(限)ケトプロフェンテープ20mg「BMD」(7枚/袋)
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」(7枚/袋)
(約束)ケナコルト-A含嗽水(400mL/本)
(約束)2Vケナコルト-A含嗽水(400mL/本)
ゲーベンクリーム1%
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)

— こ —

コソプト配合点眼液(5mL/本)
(院外)コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/本)
(院外)コレクチム軟膏0.25%(5g/本)
(院外)コレクチム軟膏0.5%(5g/本)

— さ —

サージセルガーゼ型 5.1*7.6
サージセル綿型II 2.5*5.1*2.5
(限)サーファクテン気管注入用(120mg/V)
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)
ザラカム配合点眼液(2.5mL/本)
サリチル酸ワセリン軟膏5%
サリベート(50g/本)
サルコートカプセル外用 50 μ g
サルタノールインヘラー100 μ g(13.5mL/本)
サンコバ点眼液0.02%(5mL/本)
サンピロ点眼液2%(5mL/本)

— し —

次亜塩6%「ヨシタ」←削除;在庫限り
シエルガン0.5%眼粘弾剤
(院外)ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液
5%
ジクアス点眼液3%(5mL/本)←削除;在庫なくなり次第
「院外のみ」に変更

ジクアス LX 点眼液3% (5mL/本)

(限)ジクトルテープ75mg

(院外)ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」(25g/本)

ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」(100g/本)

ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」

シムビコートタービュヘイラー60吸入

次没食子酸ピスマス「ニッコー」(デルマトール)

硝酸イソソルビドテープ「EMEC」(40mg)

— す —

(院外)スチックゼノールA(40g/本)

スピオルトレスピマット60吸入

スピール膏M25cm²

スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入

スープレン吸入麻酔液(240mL)

スポンゼル(5 \times 2.5cm)

スミスリンローション5%

— せ —

(外用用)生理食塩液

(点眼用)生理食塩液

(約束)ZA

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

セルタッチテープ70 10cm \times 14cm(7枚/包)

セルタッチパップ140 20 \times 14cm(7枚/包)

ゼルフオーム100号

(院外)セレベント50ディスカス 60ブリスター

— そ —

ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)

— た —

ダイアアップ坐剤(4mg)(6mg)(10mg)

タコシール組織接着用シートレギュラーサイズ^{*}(9.5 \times 4.8cm)

タコシール組織接着用シート ハーフサイズ^{*}(4.8 \times 4.8cm)

タブコム配合点眼液(2.5mL/本)

タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)

(院外)タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL/本)

(院外)タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)

タリビッド耳科用液0.3%(5mL/本)

(院外)タリムス点眼液0.1%(5mL/本)

— ち —

チアミール水0.025%(5L)

チアミール水0.1%(500mL/本)

チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)

— つ —

ツロブテロールテープ「VTRS」2mg

— て —

(院外)ディビゲル1mg(1g/包)

(約束)デカドロン含嗽水(400mL/本)

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2g/本)

デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」(5mL/本)

デュアック配合ゲル(10g/本)

デュオトラバ配合点眼液(2.5mL/本)

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏(0.6g/本)

テリルジー100エリプタ30吸入用

テリルジー200エリプタ30吸入用

デルモベート軟膏0.05%(5g/本)

テレミンソフト坐薬(10mg)

— と —

ドボネックス軟膏 50 μ g/g (30g/本)

トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)

(院外)トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g
「大正」

トルソプト点眼液1%(5mL/本)

トロンビン液モチダソフトボトル1万(10mL/本)

— な —

ナウゼリン坐剤(10mg)(30mg)(60mg)

ナゾネックス点鼻液50 μ g 112噴霧用

(院外)ナパゲルンローション(50mL/本)

— に —

ニゾラールクリーム2% (10g/本)

ニゾラールローション2% (10g/本)

ニトロダームTTS(25mg/10cm²)

ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)

(院外)ニュープロパッチ(2. 25mg)

ニュープロパッチ(4. 5mg)

— ね —

(院外)ネオキシテープ(73. 5mg)

ネオシネジンコーワ点眼液5%(10mL/本)

ネオメドロールEE軟膏0. 1%(3g/本)

ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (5g/本)

— の —

(限)(科限定)ノルスパンテープ(5mg)

(院外)(限)(科限定)ノルスパンテープ(10mg)

— は —

ハイポエタノール2%(500mL/本)

バクスマー一点鼻粉末剤(3mg)

バクトロバン鼻腔用軟膏(3g/本)

(院外)パスタロンソフト軟膏10%

パタノール点眼液0. 1%(5mL/本)

パルミコート200 μ g タービュヘイラー112吸入

(院外)パルミコート吸入液0. 25mg(2mL)

(院外)パルミコート吸入液0. 5mg(2mL)

(限)ハルロピテープ(40mg)

— ひ —

(院外)ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0. 1%「日点」

ヒアルロン酸 Na 0. 85眼粘弾剤1%「生化学」

ヒアレイン点眼液0. 1%(5mL/本)

(院外)ヒアレイン点眼液0. 3%(5mL/本)

ヒアレインミニ点眼液0. 3%(0. 4mL/本)

PA・ヨード点眼洗眼液0. 2% (20mL/瓶)

ビーエスエスプラス500眼灌流液 0. 0184 %

(約束)ピオクタニン液1%

(約束)鼻洗剤

ビーゾカイン歯科用ゼリー20%

ビソノテープ(4mg)

(院外)ビソルボン吸入液0. 2%(45mL/瓶)

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g/本)

(院外)ピマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL/本)

(院外)ヒルドイドソフト軟膏0. 3%(25g/本)

(院外)ヒルドイドローション0. 3%(50g/本)

ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用

ピレノキシシ懸濁性点眼液0. 005%「参天」

— ふ —

フィブラストスプレー500

[製剤原料]フェノール(液状)

フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」

(麻)フェントステープ(0. 5mg)(1mg)(2mg)(4mg)(8mg)

ブデソニド吸入液0. 25mg(2mL)「武田テバ」

ブデソニド吸入液0. 5mg(2mL)「武田テバ」

フラジール錠(250mg)

(院外)フランドルテープ(40mg)

プリピナ液0. 05%(500mL/本)

フルオロメロン点眼液0. 02%「ニッー」(5mL/本)

フルオロメロン点眼液0. 1%「ニッー」(5mL/本)

フルオロメロン点眼液0. 1%「NIT」(5mL/本)

フルタイド50 μ g エアゾール 120吸入用

フルタイド100ディスカス 60ブリスター

フルタイド200ディスカス 60ブリスター

(院外)フルティフォーム50エアゾール120吸入用

フルティフォーム125エアゾール120吸入用

(院外)小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用

(院外)フルメロン点眼液0. 02%(5mL/本)

(院外)フルメロン点眼液0. 1%(5mL/本)

プレグランディン腔坐剤(1mg)

プレドニゾン軟膏0. 5%「VTRS」←削除:在庫なくなり次第

プレドニン眼軟膏0. 25%(5g/本)

プロウペス腔用剤10mg

プロスタンディン軟膏0. 003%(30g/本)

プロトピック軟膏 0. 1%(5g/本)

プロトピック軟膏0. 03%小児用(5g/本)

(院外)プロナック点眼液0. 1%(5mL/本)

プロビスク0. 85眼粘弾剤1%(0. 85mL)

プロペト

ブロマゼパム坐剤3mg「サント」

ブロムフェナク Na 点眼液0. 1%「日点」(5mL)

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイー」

(45mL/本)

— へ —

(院外)ペガモックス点眼液0.5%(5mL/本)
ヘキサック水R0.05%(500mL/本)
ベストロン耳鼻科用1%(5mL/本)
ベストロン点眼用0.5%(5mL/本)
ベセルナクリーム5%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション
0.05%「MYK」
(院外)ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液
0.1%「日点」
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/瓶)
ベノキシル点眼液0.4%(10mL/本)
(院外)ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%
「日本臓器」(100g/本)
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(25g/本)
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラケル」(50g/本)
(院外)ベピオゲル(2.5%/15g)
ヘモポリゾン軟膏(2g)「ジエトル7」
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL)(3mL)
ペンタサ注腸1g
ペンタサ坐剤1g
(院外)ペンレステープ18mg

— ほ —

ポアラ軟膏0.12%(5g/本)
(院外)ホクナリンテープ(0.5mg)(1mg)(2mg)
(院外)ポステリザン軟膏強力(2g/本)
ポスミン外用液0.1%(100mL/瓶)
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」
ポピヨドンスクラブ7.5%
ポビドンヨード消毒液10% 250mL
ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」
ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」
ボラザG軟膏(2.4g/本)
(院外)ボルタレンゲル1%(50g/本)
(院外)ボルタレンサポ(12.5mg)
ボルタレンサポ(25mg)(50mg)
(院外)ボルタレンテープ15mg(7枚/包)
(院外)ボルタレンローション1%(50g/本)
ボルヒール組織接着用(1mL)(3mL)

— ま —

人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)
マイトマイシン眼科外用液
0.5w/v% マスキン水

— み —

ミオコールスプレー(0.3mg)
ミケランLA点眼2%(2.5mL/本)
(院外)ミケルナ配合点眼液
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)
ミドリンP点眼液(10mL/本)
ミレーナ(52mg)

— む —

(院外)ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)
無水エタノール

— め —

滅菌精製水
(院外)メノエイドコンビパッチ
メプチンスイングヘラー10 μ g 吸入100回
(院外)メプチン吸入液ユニット0.3mL

— も —

(院外)モイゼルト軟膏0.3%(10g/本)
(院外)モイゼルト軟膏1%(10g/本)
(約束)モーズ軟膏
(院外)モーラステープL40mg(7枚/包)
モーラスパップXR120mg(7枚/包)
(院外)モーラスパップXR240mg(7枚/包)

— ゆ —

(院外)ユーパスタコーワ軟膏(100g/本)
(院外)ユベラ軟膏

— ら —

(院外)ラクティオンパップ70mg(7枚/包)
ラクリミン点眼液0.05%(5mL/本)
(院外)ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
(2.5mL/本)

ラミシールクリーム1%(10g/本)

— り —

(院外)リザベン点眼液0.5%(5mL/本)

(約束)10%リドカインゲル

リドカインテープ18mg「NP」

(院外)リドメックスコーワクリーム0.3%(5g/本)

(院外)リドメックスコーワ軟膏0.3%

リドメックスコーワローション0.3%(15g/本)

リバスタッチパッチ(4.5mg)

リバスタッチパッチ(9mg)

リレンザ(5mg)(4プリスター/枚)

(院外)リンデロン坐剤(1.0mg)

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)

リンデロンVG軟膏0.12%(5g/本)

リンデロンVGローション0.12%(10mL/本)

— る —

(約束)ルゴール液3%

ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)

ルリコンクリーム1%(10g/本)

— れ —

(院外)レクタブル2mg注腸フォーム14回

新レシカルボン坐剤

(院外)レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)

レスタミンコーワクリーム1%

レゾルシン

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(5mL/本)

レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(5mL/本)

レルベア200エリプタ30吸入用

レルベア100エリプタ30吸入用

— ろ —

ロキソニンゲル1%(25g/本)

(院外)ロキソニンテープ100mg(7枚/包)

(院外)ロキソニンパップ100mg(7枚/包)

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/包)

ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/包)

ロコアテープ(7枚/袋)

ロコイドクリーム0.1%(5g/本)

ロゼックスゲル0.75%(50g/本)

ロナセンテープ20mg

— わ —

ワコビタール坐剤(15mg)(30mg)

約束処方一覧

2024年10月1日

製剤名	組成	処方単位	備考	効能
アズノールうがい液	アズノール含嗽液 10% 0.25ml キシロカイン液 4% 10ml 注射用水 490ml total 500ml	500ml 単位	遮光・室温保存 使用期限:2週間	放射線性口内炎
アセモローション	レゾルシン 10g 精製イオウ 25g 亜鉛華デンプン 200g グリセリン 50ml エタノール 175ml 精製水 全量 600ml	50ml、 100ml	遮光・室温保存	あせも
液状フェノール(5ml)	液状フェノール(5ml)		冷暗所保存 使用期限:2年	陥入爪周囲の壊死
3%塩化ナトリウム 吸入液	10%塩化ナトリウム注射液 30ml 注射用水 70ml total 100ml	5ml単位	遮光・室温保存 使用期限:6ヶ月	
3%塩化ナトリウム 点眼液	10%塩化ナトリウム注射液 30ml 注射用水 70ml total 100ml	5ml単位	遮光・室温保存 使用期限:6ヶ月	
ケナコルト A 含嗽水 (400ml/本)	筋注用ケナコルト A 1V(40mg) 精製水 全量 400ml		使用期限:1ヶ月	再発性アフタ
2V ケナコルト A 含嗽水 (400ml/本)	筋注用ケナコルト A 2V(80mg) 精製水 全量 400ml		使用期限:1ヶ月	再発性アフタ
CMCP (1g/1包)	【後】ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 0.6g 【後】チザニジン顆粒 0.2%「日医工」0.25g バランス散 10% 0.05g カフェイン原末 0.03g 乳糖 0.06g 全量 1g	1g/1包		疼痛
デカドロン含嗽水 (400ml/本)	デカドロン注 1A(3.3mg) 精製水 全量 400ml			再発性アフタ
ピオクタニン液1%	塩化メチルロザリニン1g 注射用水全量 100ml		使用期限:6ヶ月	が口瘡(口腔カンジダ)、etc.
鼻洗剤(1回分)	炭酸水素ナトリウム 4g 塩化ナトリウム 4g		1包を500mlのぬるま湯に溶かして鼻洗。	

ポラプレジンク OD 懸濁液	ポラプレジンク OD 錠75mg 2錠 アルロイド G 内用液 60ml		冷暗所保存 4週間	癌化学療法時における口内炎
モーズ軟膏 (100g作成時)	塩化亜鉛 50g 蒸留水 25ml 亜鉛華でんぷん 20g グリセリン 15ml	50g	室温保存 随時粘性の調製 必要	・易出血性腫瘍に対する外科的処置 ・癌病巣周囲からの悪臭の消臭、出血の固定
10%リドカインゲル (250g作成時)	リドカイン塩基 27.5g プロピレングリコール 55ml 局方エタノール 105.05ml ハイビスワコー 2.75g ジイソプロパノールアミン3.025g 注射用水 100ml	50g	密封・冷所保存 使用期限:3ヶ月	疼痛緩和
ルゴール液3%	ヨウ素3g ヨウ化カリウム6g 注射用水全量100ml		遮光・室温保存 使用期限:6ヶ月	
メントール・レスタミン軟膏	トメントール 10g レスタミンワクリーム 90g 無水エタノール 2.5mL	100g 20g		
LH	ロイド [®] クリーム:ヘパリン類似物質油性クリーム=1:1	10 30g	12週間	
NH	ネリゾナユニバーサルクリーム:ヘパリン類似物質油性クリーム=1:1	30g	12週間	
ZA	亜鉛華単軟膏:アズノール軟膏 =1:2	10g、 30g	4週間	
RZ	リンデロンVG軟膏:亜鉛華単軟膏 =1:1	10g、 30g	4週間	
HP	ヘパリン類似物質油性クリーム:プロペト=1:1	50g、 100g	4週間	

限定薬一覧表 (処方)

* 印の薬品は在宅医療・在宅自己注射用に処方する場合のみ患者登録が必要です 2024年10月1日現在

薬品名		薬品名	
処方	アドシルカ錠20mg	処方	* 在宅医療・自己注射用
	アブストラル舌下錠200µg		* ガスター注射液20mg 2mL
	イクスタンジ錠40mg		* 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL
	インライタ錠1mg		* グルアセト35注 500mL
	インライタ錠5mg		* KCL 注20mEq キット「テルモ」 20mL
	ヴオトリエント錠200mg		* ゴナトロピン筋注用3000単位
	(院外)オキノーム散10mg(1包1g)		* ゴナトロピン注用5000単位
	オキノーム散2% 20mg(1包1g)		* (院外)静注用フローラン1.5mg(溶解液付)
	オプスミット錠10mg		* 生食注シリンジ「NP」5mL
	ケアラム錠 25mg		* (院外)セファメジンα 点滴用キット(2g)
	(院外)ケトプロフェンテープ 20mg		* 注射用水(500mlソフトバッグ)
	ゴナールエフ皮下注ペン300		* デカドロン注射液3.3mg 1mL
	サーファクテン気管注入用120mg		* ブスコパン注20mg 2% 1mL
	サムスカOD錠30mg		* プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL
	サラジェン錠5mg		* プロテアミン12注射液200mL
	スタレボ配合錠 L50 L100		* (院外)フェンタニル注0.25mg「テルモ」5mL
	スーテントカプセル12.5mg		* ヘパリンNaロック用100単位/ml シリンジ「オーツカ」10ml
	タルチレリン錠5mg「サワイ」		* ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ
	デエビゴ錠2.5mg		* (院外)モルヒネ塩酸塩注射液1%
	トラクリア錠62.5mg		
	ネクサパール錠200mg		
	ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位		
	ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		
	(院外)ノルspanテープ10mg		
	ノルspanテープ5mg		
	ハイドレアカプセル500mg		約束手方
	ハルロピテープ40mg		(約束手方)10%リドカインゲル
	(院外)ファロム錠200mg		(約束手方)モーズ軟膏
	プログラフ顆粒0.2mg ※削除品目 2023.2月		
	フロリネフ錠0.1mg		血糖測定電極
	メソトレキセート錠2.5mg		メディセーフフィットチップ
	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」		
モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」	処方科限定薬		
ラコーラ NF 配合経腸用半固形剤	ノルspanテープ /整形・麻酔科		
リスペリドン OD 錠2mg「アメル」	ツムラ63五積散 /麻酔科		
ロイコボリン錠5mg	ビオフェルミン R 散 /小児科		
ワーファリン錠5mg			

