

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
アテゾリズマブ+nab-PTX	28日間	軽度催吐性リスク

輸液セット
★インラインフィルター

★アテゾリズマブ投与時は0.2μmまたは0.22μmのインラインフィルターを使用し、アルブミン懸濁型パクリタキセル投与時はインラインフィルターは使用してはいけない

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●														●													
2	アテゾリズマブ* 生理食塩液	840mg/body 250mL	メイン フィルターあり	1時間	●														●													
3	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●														●													
4	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	メイン	30分	●							●							●													
5	アルブミン懸濁型パクリタキセル** 生理食塩液***	100mg/m ² 薬剤科で調整	メイン フィルター不可	30分	●							●							●													
6	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●							●													

*初回1時間。インフュージョンリアクション問題なければ30分へ短縮可。

**アルブミン懸濁型パクリタキセルはインラインフィルターを使用してはいけない

***アルブミン懸濁型パクリタキセルは100mg/生理食塩液20mLとなるように薬剤科にて調製

o