

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|---------|------|----------|
| PTX+BEV | 28日間 | 軽度催吐性リスク |

| 輸液セット |
|------------|
| インラインフィルター |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|-----|---|-------------------------------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | デキサメタゾン d-クロルフェニラミン ファモチジン 生理食塩液 | 6.6mg 5mg 20mg 100mL | メイン | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | パクリタキセル* 生理食塩液 | 90mg/m ² 250mL | メイン | 1時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベバシズマブ** 生理食塩液 | 10mg/kg 100mL | メイン | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

*パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用

**初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。

,