

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CPT-11+CDDP	28日間	高度度催吐性リスク(day1) 中等度催吐性リスク(day8,15)

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●						●	●						●	●											
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間	●																											
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	メイン	30分	●																											
3	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	メイン	150mL/hr	●																											
4	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 350mL	メイン	2時間	●																											
5	ヴィーンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																											
6	ヴィーンD	500mL	メイン	150mL/hr	●																											
7	ヴィーン3G	500mL	メイン	150mL/hr	●																											
8	ヴィーンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																											
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間								●								●												
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	メイン	30分								●								●												
3	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	メイン	150mL/hr								●								●												
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●								●												