

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
GEM+CBDCA	21日間	中等度催吐性リスク(アプレピタント併用)

				薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				アプレピタント125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前	●																					
				アプレピタント80mg	1カプセル	1×朝		●	●																			
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●																							
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 3.3mg	メイン	30分	●																							
3	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	メイン	30分	●																							
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 4 500mL	メイン	2時間	●																							
5	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	30分	●																							
1	生理食塩液	100mL	メイン	30分								●																
2	デキサメタゾン デキサメタゾン	6.6mg 100mL	メイン	30分								●																
3	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	メイン	30分								●																
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●																