

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Weekly TC(卵巣癌)	28日間	中等度催吐性リスク

輸液セット
<b>インラインフィルター</b>

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●																										
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●							●							●														
2	グラニセトン3mg	1バッグ	メイン	30分	●							●								●													
	d-クロルフェニラミン	5mg																															
	ファモチジン	20mg																															
	デキサメタゾン	9.9mg																															
3	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	メイン	1時間	●							●							●														
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 2 250mL	メイン	1時間	●							●								●													
5	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	30分	●							●								●													

\*パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用