

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|-------------|------|----------------------|
| BEV+FOLFIRI | 14日間 | 中等度催吐性リスク(アプレピタント併用) |

| | | 薬剤 | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | アプレピタント125mg | 1カプセル | 1×抗がん剤開始60分前 | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アプレピタント80mg | 1カプセル | 1×朝 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | グラニセトロン デキサメタゾン | 3mg/100mL 3.3mg | メイン | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ベバシズマブ* 生理食塩液 | 5mg/kg 100mL | メイン | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | レボホリナート 5%ブドウ糖 | 200mg/m ² 250mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | イリノテカン** 5%ブドウ糖 | 150mg/m ² 250mL | 側管 | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | フルオロウラシル 生理食塩液 | 400mg/m ² 100mL | メイン | 全開 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2400mg/m ² 適宜調節 | メイン | 46時間 | ● | → | | | | | | | | | | | | |

*初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。

**UGT1A1変異の有無を確認。イリノテカンはレボホリナートと同時に開始、イリノテカンの投与時間が90分であるため先に終了する