

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CET+ENC±BINI	7日間	最小度催吐性リスク

薬剤		用法	用量	1	2	3	4	5	6	7	
エンコラフェニブ		1日1回	300mg/回	●	●	●	●	●	●	●	
ビニメチニブ (3剤併用時)		1日2回	45mg/回	●	●	●	●	●	●	●	
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液*	250mL	メイン (ルートキープ)		●						
2	デキサメタゾン d-クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 5mg 100mL	側管	30分	●						
3	セツキシマブ** 生理食塩液	初回400mg/m ² 維持250mg/m ² 初回400mL 維持200mL	側管	初回 2時間 2回目以降 1時間	●						
4	生理食塩液	100mL	側管	1時間	●						

CET+エンコラフェニブの2剤併用。またはCET+エンコラフェニブ+ビニメチニブの3剤併用で使用

*生理食塩液250mLはインフュージョンリアクション対応のためのルートキープ。投与が終わるまでゆっくり滴下

**軽度～中等度(Grade1-2)のインフュージョンリアクションが発現し投与速度を減速した場合、その後の投与においても減速した速度で投与