

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CET(隔週 500mg/m ²)+ENC±BINI	14日間	最小度催吐性リスク

薬剤		用法	用量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エンコラフェニブ		1日1回	300mg/回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ビニメチニブ(3剤併用時)		1日2回	45mg/回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液*	250mL	メイン	ルートキープ	●													
2	デキサメタゾン d-クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 5mg 100mL	側管	30分	●													
3	セツキシマブ** 生理食塩液	500mg/m² 250mL	側管	2時間	●													
4	生理食塩液	100mL	側管	1時間	●													

*生理食塩液250mLはインフュージョンリアクション対応のためのルートキープ。投与が終わるまでゆっくり滴下

**軽度～中等度(Grade1-2)のインフュージョンリアクションが発現し投与速度を減速した場合、その後の投与においても減速した速度で投与

CET隔週投与レジメンのため毎週投与レジメンと用量・投与時間が違うので注意！！