

| レジメン名称         | 1コース | 催吐性リスク               |
|----------------|------|----------------------|
| mXELIRI + Bmab | 21日間 | 中等度催吐性リスク(アプレピタント併用) |

| 薬剤           | 用量                    | 用法                            | 1   | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |    |    |  |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| カペシタビン*      | 1600mg/m <sup>2</sup> | 2×朝・夕食後                       |     | →      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタント125mg | 1カプセル                 | 1×抗がん剤開始60分前                  | ●   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アプレピタント80mg  | 1カプセル                 | 1×朝                           |     | ●      | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 滴下順          | 薬剤                    | 用量                            | ルート | 投与時間   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1            | パロノセトロン<br>デキサメタゾン    | 0.75mg/50mL<br>3.3mg          | メイン | 15分    | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2            | ベバシズマブ**<br>生理食塩液     | 7.5mg/kg<br>100mL             | メイン | 1時間30分 | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3            | イリノテカン***<br>5%ブドウ糖   | 150mg/m <sup>2</sup><br>250mL | メイン | 1時間30分 | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4            | 生理食塩液                 | 50mL                          | メイン | 15分    | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

\*XELIRIにおけるカペシタビンの用量は1600mg/m<sup>2</sup>/dayであり、他のレジメンのカペシタビン併用時の用量(2000mg/m<sup>2</sup>/day)とは異なるため注意

\*\*初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。

\*\*\*UGT1A1変異の有無を確認。