

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
AP	21日間	高度催吐性リスク

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
薬剤		用量	用法																						
アプレピタント125mg		1cp	1×化学療法60～90分前	●																					
アプレピタント80mg		1cp	1×朝	/	●	●																			
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼	/	●	●	●																		
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ヴィーンD	500mL	メイン	2時間	●																				
2	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間	●																				
3	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	メイン	30分	●																				
4	ドキシソルビシン 生理食塩液	60mg/m ² 50mL	メイン	15分	●																				
5	シスプラチン 生理食塩液	50mg/m ² 400mL	メイン	2時間	●																				
6	ヴィーンD	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
7	ヴィーン3G	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
8	ヴィーンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
9	ヴィーンD	500mL	メイン	150mL/hr	●																				