

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Weekly TC(子宮体癌)	28日間	中等度催吐性リスク

輸液セット
インラインフィルター

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●																										
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●							●							●														
2	グラニセロン3mg d-ククロルフェニラミン ファモチジン デキサメタゾン	1バッグ 5mg 20mg 9.9mg	メイン	30分	●							●							●														
3	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	メイン	1時間	●							●							●														
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 2 250mL	メイン	1時間	●							●							●														
5	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	30分	●							●							●														

*パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用