

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
AP(子宮内膜間質肉腫)	21日間	高度催吐性リスク

				薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				アプレピタント125mg	1cp	1×化学療法60~90分前	●																				
				アプレピタント80mg	1cp	1×朝		●	●																		
				デキサメタゾン	8mg	1×朝		●	●	●																	
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	ラクテック	500mL	メイン	2時間	●																						
2	ラクテック 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq/20mL	メイン	2時間	●																						
3	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 6.6mg	メイン	30分	●																						
4	ドキシソルビシン 生理食塩液	60mg/m ² 50mL	メイン	15分	●																						
5	シスプラチン 生理食塩液	100mg/m ² 300mL	メイン	2時間	●																						
6	マンニトール	300mL	メイン	30分	●																						
7	フロセミド	20mg	側管	静注	●																						
8	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●																						
9	ソリタT3	500mL	メイン	3時間	●																						
10	ソリタT3	500mL	メイン	4時間	●																						