

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CPT-11+CDDP(子宮頸癌)	28日間	高度度催吐性リスク(day1) 中等度催吐性リスク(day8,15)

		薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼		●	●						●	●						●	●												
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間	●																												
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	メイン	30分	●																												
3	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	メイン	150mL/hr	●																												
4	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m ² 350mL	メイン	2時間	●																												
5	ヴィーンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																												
6	ヴィーンD	500mL	メイン	150mL/hr	●																												
7	ヴィーン3G	500mL	メイン	150mL/hr	●																												
8	ヴィーンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																												
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間								●								●													
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 9.9mg	メイン	30分								●								●													
3	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	メイン	150mL/hr								●								●													
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●								●													