

| | | |
|--------------|------|-----------|
| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
| CE+アテゾリズマブ療法 | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| |
|-------------------|
| 輸液セット |
| インラインフィルター |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | 用法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | アプレピタント125mg | 1cp | 1×化学療法60～90分前 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アプレピタント80mg | 1cp | 1×朝 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | アテゾリズマブ* 生食 | 1200mg 250mL | メイン | 60分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | パロノセトロン デキサメタゾン | 0.75mg 3.3mg | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | カルボプラチン 生理食塩液 | AUC5 250mL | メイン | 1時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | エトポシド** 5%ブドウ糖液 | 100mg/m ² 500mL | メイン | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | デキサメタゾン 生理食塩液 | 3.3mg 50mL | メイン | 15分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | エトポシド** 5%ブドウ糖液 | 100mg/m ² 500mL | メイン | 1時間30分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CE療法は4クールまで。その後はアテゾリズマブ療法のみを3週毎に継続

*アテゾリズマブは忍容性に問題がなければ2回目以降30分に短縮可。インラインフィルター使用

**エトポシドは調製後時間経過とともに結晶析出するため、調製後8時間以内に終了すること。DHPフリールート使用