

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
GC 3週間	21日間	軽度催吐性リスク(day1,8) 高度催吐性リスク(day2)

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレピタント125mg		1cp	1×化学療法60～90分前			●																			
アプレピタント80mg		1cp	1×朝			/	●	●																	
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼			/	●	●	●																
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	メイン	30分	●							●													
2	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	メイン	30分	●							●													
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●													
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ヴィーンD	500mL	メイン	2時間		●																			
2	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間		●																			
3	5%ブドウ糖液	500mL	メイン	2時間		●																			
	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	メイン	15分		●																			
4	マンニトール	300mL	メイン	30分		●																			
5	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m <sup>2</sup> 300mL	メイン	2時間		●																			
6	5%ブドウ糖液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																			
7	生理食塩液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																			
8	生理食塩液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																			