

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
GC 4週間	28日間	軽度催吐性リスク(day1,8,15) 高度催吐性リスク(day2)

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アプレピタント125mg		1cp	1×化学療法60～90分前		●																											
アプレピタント80mg		1cp	1×朝		/	●	●																									
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼		/	●	●	●																								
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	メイン	30分	●							●							●													
2	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	メイン	30分	●							●							●													
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●							●													
1	ヴィーンD	500mL	メイン	2時間		●																										
2	ヴィーンF	500mL	メイン	2時間		●																										
3	5%ブドウ糖液	500mL	メイン	2時間		●																										
	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	メイン	15分		●																										
4	マンニトール	300mL	メイン	30分		●																										
5	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m <sup>2</sup> 300mL	メイン	2時間		●																										
6	5%ブドウ糖液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																										
7	生理食塩液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																										
8	生理食塩液 アスパラギン酸カリウム	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																										