

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
FP(肛門癌)	21日間	高度催吐性リスク

				薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				アプレピタント125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																					
				アプレピタント80mg	1cp	1×朝		●	●																			
				デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼		●	●	●																		
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	生理食塩液	500mL	メイン	2時間	●																							
2	ソリタT3 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq	メイン	2時間	●																							
3	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg /50mL 9.9mg	メイン	15分	●																							
4	CDDP 生理食塩液	60mg/m ² 300mL	メイン	2時間	●																							
5	20%マンニトール	300mL	メイン	30分	●																							
6	5-FU 生理食塩液	1000mg/m ² 1300mL	メイン	24時間	●	●	●	●																				
7	ソリタT3	500mL	側管	2時間	●	5-FUと同時に開始																						