

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
GCD	21日間	中等度催吐性リスク

輸液セット
<b>インラインフィルター</b>

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン		8mg	1×朝			●	●						●	●											
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	250mL	メイン	1時間30分	●																				
2	生理食塩液	50mL	側管	15分	●																				
3	デュルバルマブ* 生理食塩液	1500mg 100mL	側管	1時間	●																				
4	生理食塩液	50mL	側管	15分	●																				
5	生理食塩液	500mL	メイン	2時間	●							●													
6	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	側管	30分	●							●													
7	シスプラチン 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 250mL	側管	1時間	●							●													
8	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	側管	30分	●							●													
9	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●							●													

\*インラインフィルターを使用すること

体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg(体重)

デュルバルマブとGCの併用は最大8コースまで