

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
IP(CPT-11+CDDP)	28日間	高度催吐性リスク(day1) 中等度催吐制リスク(day8,15)

薬剤		用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
アプレピタント125mg		1cp	1×化学療法60～90分前	●							●							●														
アプレピタント80mg		1cp	1×朝		●	●						●	●						●	●												
デキサメタゾン		8mg	2×朝・昼		●	●	●																									
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	30分	●																											
2	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	メイン	90分	●																											
3	塩化カリウム 硫酸マグネシウム 生理食塩液	5mEq 4mEq 500mL	メイン	60分	●																											
4	塩化カリウム 硫酸マグネシウム 生理食塩液	5mEq 4mEq 500mL	メイン	60分	●																											
5	20%マンニトール	300mL	メイン	40分	●																											
6	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	メイン	60分	●																											
7	塩化カリウム 生理食塩液	5mEq 500mL	メイン	60分	●																											
8	塩化カリウム 生理食塩液	5mEq 500mL	メイン	60分	●																											
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 6.6mg	メイン	30分								●							●													
2	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	メイン	90分								●							●													
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●							●													