

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
IE	21日間	中等度催吐性リスク

ルート
閉鎖式ルート

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
アプレピタント125mg	1cp	1×化学療法60~90分前	●																						
アプレピタント80mg	1cp	1×朝	/	●	●																				
デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝昼	/	●	●	●	●																		
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分	●																				
2	エトポシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	側管	2時間	●	●	●	●	●																
3	イホスファミド ウロミテキサン 生理食塩液	1.8g/m ² 360mg/m ² 500mL	側管	2時間	●	●	●	●	●																
4	ウロミテキサン 生理食塩液	360mg/m ² 100mL	側管	30分	●	●	●	●	●	イホスファミド開始から4時間後															
5	ウロミテキサン 生理食塩液	360mg/m ² 100mL	側管	30分	●	●	●	●	●	イホスファミド開始から8時間後															

メインルートはパスで管理のためレジメンとは別でオーダーが必要

ルート
閉鎖式ルート

★ルートは、抗がん剤用とメイン用でそれぞれ準備

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パス	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●	●															
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●	●															
	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●																
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●																
	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●																
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●	●																