

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Dose-Dense TC(卵巣癌)	21日間	中等度催吐性リスク(アプレピタント併用)

輸液セット
インラインフィルター

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレピタント125mg		1カプセル	1×抗がん剤開始60分前		●																				
アプレピタント80mg		1カプセル	1×朝			●	●																		
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン3mg d-クロルフェニラミン ファモチジン デキサメタゾン	1バッグ 5mg 20mg 9.9mg	メイン	30分	●																				
2	パクリタキセル* 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	メイン	1時間	●																				
3	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 6 250mL	メイン	1時間	●																				
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●																				
1	d-クロルフェニラミン ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	5mg 20mg 6.6mg 100mL	メイン	30分								●							●						
2	パクリタキセル* 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	メイン	1時間								●							●						
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●							●						

*パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用