

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|------------------|------|----------|
| Weekly PTX(血管肉腫) | 28日間 | 軽度催吐性リスク |

| 輸液セット |
|------------|
| インラインフィルター |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|-----|---|-------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | デキサメタゾン d-クロルフェニラミン ファモチジン 生理食塩液 | 6.6mg 5mg 20mg 100mL | メイン | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | パクリタキセル* 生理食塩液 | 80mg/m ² 250mL | メイン | 1時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

*パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用