

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
IFM	21日間	高度催吐性リスク

ルート
閉鎖式ルート

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
アプレピタント125mg	1cp	1×化学療法60~90分前	●																						
アプレピタント80mg	1cp	1×朝	●	●																					
デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝昼	●		●																				
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分	●																				
1'	デキサメタゾン 生理食塩液	9.9mg 100mL	側管	30分		●	●																		
2	イホスファミド 生理食塩液	3g/m ² 500mL	側管	4時間	●	●	●																		
3	メスナ*	600mg/m ²	メインの側管		●	●	●																		
4	生理食塩液	50mL	側管	全開	●	●	●																		
5	メスナ*	600mg/m ²	メインの側管		●	●	●																		
6	メスナ*	600mg/m ²	メインの側管		●	●	●																		

* メスナ(ウロミテキサン)はメインルートから静注。

メインルートはパスで管理のためレジメンとは別でオーダーが必要

ルート
閉鎖式ルート

★ルートは、抗がん剤用とメイン用でそれぞれ準備

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パス	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●																	
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●	●																	
	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●																		
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●																		
	ソリタT3 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●																		
	ソリタT1 メイロン 8.4%	500mL 20mL	メイン	4時間	●	●	●																		