

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
mFOLFOX+HER	42日間	中等度催吐性: day1,15,29 最小度催吐性day22

薬剤		用量	用法	1	2	3	4	～	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	～	42	
アプレピタント		125mg	1×朝	●					●														●						
アプレピタント		80mg	1×朝		●	●				●	●													●	●				
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	～	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	～	42
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	30	●					●														●					
1'	生理食塩液	100mL	メイン	全開													●												
2	トラスツズマブ※	(初回)8mg/kg (維持)6mg/kg	メイン	(初回)90分 (2回目～)30分	●												●												
	生理食塩液	250mL																											
3	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●												●												
4	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●					●														●					
	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL			側管	2時間	●					●													●				
5	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	メイン	全開	●					●														●					
6	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 適宜調節	メイン	46時間	●	→				●	→												●	→					

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。