レジメン名称	1コース	催吐性リスク
FP（CDDP）+ペムブロリズマブ	21日間	高度催吐性リスク（day1） 軽度催吐性リスク（day2-4）

輸液セット
インラインフィルター（day1）

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	アプレピタントカプセル	125mg	1×化学療法60～90分前	●																				
		80mg	1×朝		●	●																		
	デキサメタゾン	8mg	1×朝		●	●	●																	

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	500mL	メイン	2時間	●																				
2	生理食塩液	50mL	側管	15分	●																				
3	ペムブロリズマブ* 生理食塩液	200mg/body 50mL	側管	30分	●																				
4	生理食塩液	50mL	側管	15分	●																				
5	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分	●																				
6	硫酸マグネシウム 生理食塩液	8mEq 50mL	側管	30分	●																				
7	シスプラチン 生理食塩液	100mg/㎡ 300mL	メイン	2時間	●																				
8	20%マンニトール	300mg	メイン	30分	●																				
9	5-FU 生理食塩液	1000mg/㎡ 1300mL	メイン	24時間	●	●	●	●																	
10	ソリタT3	500mL	側管	2時間	●																				
11	ソリタT3	500mL	側管	2時間	●																				

*インラインフィルターを使用すること

2024/9/12