

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Pembrolizumab+TC(子宮体癌)	21日間	中等度催吐性リスク

輸液セット
インラインフィルター

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	日																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	薬剤	用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	アプレピタント125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前		●																				
	アプレピタント80mg	1カプセル	1×朝			●	●																		
1	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●																				
2	ペムブロリズマブ* 生理食塩液	200mg/body 50mL	メイン	30分	●																				
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●																				
4	グラニセトロン d-クロルフェニラミン ファモチジン デキサメタゾン	3mg/100mL 5mg 20mg 16.5mg	メイン	30分	●																				
5	パクリタキセル** 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	メイン	3時間	●																				
6	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 5 500mL	メイン	2時間	●																				
7	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	30分	●																				

*インラインフィルターを使用

**パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DHPフリールート使用

注意) Pembrolizumab+TC終了後は、[6週] Pembrolizumab 400mg(子宮体癌 化学療法併用後)へ移行