

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
PLD+CBDCA	28日間	中等度催吐性リスク(アプレピタント併用)

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	アプレピタント125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前	●																												
	アプレピタント80mg	1カプセル	1×朝		●	●																										
	デキサメタゾン	4mg	1×朝		●	●																										
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 3.3mg	メイン	30分	●																											
2	リポソーマルドキソルビシン 5%ブドウ糖液	30mg/m ² 250mL	メイン	1時間30分	●																											
3	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	30分	●																											
4	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	メイン	2時間	●																											
5	5%ブドウ糖液	100mL	メイン	15分	●																											

*インラインフィルターを使用してはいけない

インフュージョンリアクション予防のため、投与速度は1mg/minを超えないよう注意。

インフュージョンリアクションは投与30分以内に発現することが多いため特に注意。