

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Pembro+TC+BEV(子宮頸癌)	21日間	中等度催吐性リスク

輸液セット
インラインフィルター

滴下順	薬剤	用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アプレビタント125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前		●																				
2	アプレビタント80mg	1カプセル	1×朝			●	●																		
3	生理食塩液	100mL	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	ペムブロリズマブ*	200mg/body 50mL	メイン	30分	●																				
5	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●																				
6	グラニセトロン d-クロルフェニラミン ファモチジン デキサメタゾン	3mg/100mL 5mg 20mg 16.5mg	メイン	30分	●																				
7	パクリタキセル** 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	メイン	3時間	●																				
8	カルボプラチナ 生理食塩液	AUC 5 250mL	メイン	1時間	●																				
9	ベバシズマブ*** 生理食塩液	15mg/kg 100mL	メイン	1時間30分	●																				
10	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●																				

*インラインフィルターを使用

**/パクリタキセルが結晶として析出する可能性があるのでインラインフィルターを使用する。DEHPフリールート使用

***ベバシズマブ初回90分で問題なければその後60分。それでも問題なければ30分まで短縮可能

注意)Pembro+TC+BEV終了後は、Pembro+BEV維持療法(化学療法併用後)もしくはBEV維持療法(化学療法併用後)へ移行