

| レジメン名称    | 1コース | 催吐性リスク    |
|-----------|------|-----------|
| オプジーボ(胃癌) | 28日間 | 最小度催吐性リスク |

| 輸液セット      |
|------------|
| インラインフィルター |

| 滴下順 | 薬剤              | 用量             | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-----|-----------------|----------------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 生理食塩液           | 50mL           | メイン | 15分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ニボルマブ*<br>生理食塩液 | 480mg<br>100mL | メイン | 30分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | 生理食塩液           | 50mL           | メイン | 15分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

\*インラインフィルターを使用すること