

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
【Ccr<60】Durvalumab+GC	21日間	高度催吐性リスク

輸液セット
インラインフィルター

滴下順	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	アプレピタント125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●							●														
	アプレピタント80mg	1cp	1×朝		●	●						●	●												
	デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼		●	●	●					●	●	●											
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	メイン	(day 1)15分 (day 8) 30分	●							●													
2	生理食塩水	50mL	メイン	15分	●							X													
3	デュルバルマブ*	1500mg	メイン	1時間	●							X													
4	生理食塩水	50mL	メイン	15分	●							X													
5	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	メイン	30分	●							●													
6	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●													
7	硫酸Mg補正液 生理食塩液	8mEq 500mL	メイン	1時間30分	●							●													
8	マンニトール	300mL	メイン	30分	●							●													
9	シスプラチニン 生理食塩液	35mg/m ² 400mL	メイン	2時間	●							●													
10	アスパラギン酸カリウム 5%ブドウ糖液	10mEq 500mL	メイン	1時間30分	●							●													
11	アスパラギン酸カリウム 生理食塩液	10mEq 500mL	メイン	1時間30分	●							●													
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩水	500mL	メイン	2時間		●	●						●	●											
2	5%ブドウ糖液	500mL	メイン	2時間		●	●						●	●											

*インラインフィルターを使用

*体重30kg以下の場合、維持療法における1回投与量は、20mg/kg(体重)とする。