

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
アテゾリズマブ+nab-PTX	28日間	軽度催吐性リスク

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●														●													
2	アテゾリズマブ	840mg/body	メイン	1時間※	●															●												
	生理食塩液	250mL	フィルターあり																													
3	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●														●													
4	デキサメタゾン	6.6mg	メイン	30分	●							●								●												
	生理食塩液	100mL																														
5	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	メイン	30分	●							●								●												
	生理食塩液	50mL**																														
6	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●							●													

※ :初回60分。インフュージョンリアクション問題なければ30分へ短縮可。

※※:アルブミン懸濁型パクリタキセルは100mg/生理食塩液20mLとなるように薬剤科にて調製

注:アテゾリズマブ投与時は0.2μmまたは0.22μmのインラインフィルターを使用し、アブラキサン投与時はインラインフィルターは使用しない。