レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CP	21日間	高度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																				
	イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●																		
	デキサメタゾン	8mg(16錠)	2×朝・昼		●	●	●	○※	※○は嘔気によっ5日目まで内服も可															

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ソリューゲンF	500mL	メイン	2時間	●																				
2	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	30分	●																				
3	シクロホスファミド 生理食塩液	700mg/㎡ 100mL	メイン	30分	●																				
4	シスプラチン 生理食塩液	70mg/㎡ 300mL	メイン	2時間	●																				
5	ソリューゲンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
6	ソリューゲン3G	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
7	ソリューゲンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																				
8	ソリューゲンG	500mL	メイン	150mL/hr	●																				