

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|--------------|------|----------|
| GEM+BEV(卵巣癌) | 21日間 | 軽度催吐性リスク |

【条件付き承認】患者限定で承認のため治療終了と同時に削除

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|------------------|--------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | デキサメタゾン 生理食塩液 | 6.6mg 100mL | メイン | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ペバシズマブ※ 生理食塩液 | 15mg/kg 100mL | メイン | 1時間30分*2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ゲムシタビン 生理食塩液 | 1000mg/m ² 100mL | メイン | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

※ペバシズマブ初回90分で問題なければその後60分。それでも問題なければ30分まで短縮可能