レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Weekly TC	28日間	中等度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	ジフェンヒドラミン	50mg（5錠）	パクリタキセル投与開始 30分前までに内服	●							●							●													
	デキサメタゾン	8mg(16錠)	2×朝・昼		●	●	○※					●	●	○※					●	●	○※		※○は嘔気によって4日目まで内服も可								

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソリューゲンF	500mL	メイン	2時間	●							●							●													
2	グラニセトロン3mg ファモチジン デキサメタゾン	1バッグ 20mg 9.9mg	メイン	30分	●							●							●													
3	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/㎡ 250mL	メイン フィルター付専用ルートを使用すること	1時間	●							●							●													
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 2 250mL	メイン	1時間	●							●							●													
5	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●							●							●													