

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Bev+SOX	21日間	中等度催吐性リスク

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
S-1		S-1投与量に準ずる (論文上80mg/m ² /day)	2×朝・夕食後		●	(Hatched area with arrow from Day 2 to Day 14)														●	内服14日間で終了					
アプレピタント125mg(イメド)		1cp	1×化学療法60～90分前		●																					
アプレピタント80mg(イメド)		1cp	1×朝			●	●																			
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	30分	●																					
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	メイン	1時間30分※	●																					
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●																					
4	生理食塩液	100mL	メイン	30分	●																					

※ 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。