

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CET(隔週 500mg/m <sup>2</sup> )+ENC±BINI(開始)	<b>14日間</b>	最小度催吐性リスク

	薬剤	用法	用量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(3剤併用時)	エンコラフェニブ (ビラフビ)	1日1回	300mg/回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ビニメチニブ (メトビ)	1日2回	45mg/回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	250ml	メイン (ルートキープ)		●													
2	デキサメタゾン d-クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 5mg 100mL	側管	30分	●													
3	セツキシマブ 生理食塩液	<b>500mg/m<sup>2</sup></b> <b>250mL</b>	側管	<b>2時間</b>	●													
4	生理食塩液	100mL	側管	1時間	●													

CET+エンコラフェニブの2剤併用 またはCET+エンコラフェニブ+ビニメチニブの3剤併用で使用

※CETの毎週投与レジメンと投与量・投与速度が違うので注意！！