

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
IRIS+BV	28日間	中等度催吐性リスク(イメンド併用)

薬剤		用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
S-1(ティーエスワン)		S-1投与量に準ずる	2×朝・夕食後	● 14日間内服																															
イメンド125mg		1カプセル	1×抗がん剤開始60分前	●															●																
イメンド80mg		1カプセル	1×朝		●	●														●	●														
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 3.3mg	メイン	30分	●														●																
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	メイン	1時間30分※	●														●																
3	イリノテカン 5%ブドウ糖	100mg/m ² 250mL	メイン	1時間30分	●														●																
4	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●														●																

※ 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。