

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
P-mab+FOLFIRI	14日間	中等度催吐性リスク(イメンド併用)

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イメンド125mg		1カプセル	1×抗がん剤開始60分前		●													
イメンド80mg		1カプセル	1×朝			●	●											
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1/バッグ 3.3mg	メイン	30分	●													
2	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●													
3	パニツムマブ★ 生理食塩液	6mg/kg 100mL	メイン	1時間	●													
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●													
5	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●													
	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	側管	1時間30分	●													
6	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	メイン	全開	●													
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 適宜調節	メイン	46時間	●	→												

★パニツムマブ投与の際は0.2μ mまたは0.22μ mのインラインフィルターを使用すること