

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
RAM+FOLFIRI	14日間	中等度催吐性リスク(イメンド併用)

		薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		イメンド125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前	●														
		イメンド80mg	1カプセル	1×朝		●	●												
滴下順		薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		グラニセトロン3mg d-クロルフェニラミン デキサメタゾン	1/バッグ 5mg 3.3mg	メイン	30分	●													
2		ラムシルマブ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	メイン	1時間	●													
3		生理食塩液	50mL	メイン	15分	●													
4		レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●													
		イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	側管	1時間30分	●													
5		フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	メイン	全開	●													
6		フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 適宜調節	メイン	46時間	●	→												

- ・蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用する
- ・レボホリナートとイリノテカンは同時に開始、イリノテカンは投与時間が90分であるため注意
- ・UGT1A1変異を確認しておく