

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
SIRB	21日間	中等度催吐性リスク(イメンド併用)

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	薬剤	用量	用法	● 														14日間内服							
	S-1(ティーエスワン)	S-1投与量に準ずる	2×朝・夕食後																						
	イメンド125mg	1カプセル	1×抗がん剤開始60分前	●																					
	イメンド80mg	1カプセル	1×朝		●	●																			
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 3.3mg	メイン	30分	●																				
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	メイン	1時間30分※	●																				
3	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	メイン	1時間30分	●																				
4	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●																				

※ 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。